

Module de psychiatrie rattrapage

1. La dangerosité :

- a) Est la possibilité qu'a un malade mental de commettre des actes extra sociaux
- b) Est une urgence psychiatrique.
- c) Elle peut être criminelle
- d) Elle peut être psychiatrique
- e) Elle peut être médico légale

2. parmi ces éléments lequel ou lesquels fait ou font partie du diagnostic différentiel d'une attaque de panique :

- a) infarctus du myocarde
- b) Crise d'asthme
- c) Hyperglycémie
- d) Hypoventilation
- e) Prolapsus de la valve mitrale

3. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui caractérise (ent) la schizophrénie :

- a) des conduites agressives dirigées vers des personnes spécifiques
- b) Le syndrome dissociatif ou de désorganisation
- c) L'angoisse de castration
- d) L'existence d'une phobie spécifique
- e) Une névrose bénigne

4. Tous ces signes, peuvent se voir avec l'insuffisance surrénalienne, sauf :

- a) Apathie
- b) Délire de jalousie
- c) Nervosité
- d) Irritabilité
- e) Hypersomnie

5. La Personnalité antisociale, ne se caractérise pas, par :

- a) Une transgression des droits d'autrui.
- b) Une tolérance aux frustrations
- c) Bonne adaptation sociale, malgré les troubles.
- d) Absence de culpabilité.
- e) Inaffectivité apparente.

6. Parmi ces éléments, lequel ou lesquels n'est ou ne sont pas des équivalents suicidaires :

- a) L'automutilation
- b) Le refus alimentaire
- c) Le sport à haut risque
- d) Le refus thérapeutique
- e) La prise d'antidépresseurs

7. Parmi les médicaments suivants, lequel (lesquels) peut (peuvent) engendrer le syndrome hyperkinétique :

- a) Anafranil ®
- b) **Theralene ®**
- c) Tercian ®
- d) Nozinan ®
- e) Valium®

8. Parmi les signes cliniques suivants, lequel ou lesquels est ou sont le ou les plus évocateur(s) d'une psychose schizophrénique ?

- a) Délire
- b) Hallucination
- c) **Discordance ou désorganisation**
- d) L'agitation
- e) Confusion mentale

9. Le caractère hystérique est défini par un ou plusieurs des traits de caractère suivants :

- a) Attitude séductrice
- b) **Quête affective**
- c) Rigidité du caractère
- d) Ritualisation de la vie quotidienne
- e) **Suggestibilité**

10. Le traitement par NAP au cours d'un état schizophrénique peut engendrer, comme effet(s) :

- a) Un trouble du rythme cardiaque
- b) **Dyskinésies tardives**
- c) Galactorrhée
- d) Hypertension artérielle
- e) **dépression**

11. Au cours de la mélancolie, le suicide :

- a) Fait partie de la sémiologie psychologique
- b) Met fin à un vécu de culpabilité
- c) Permet au patient de ne plus penser à la maladie
- d) Survient lors de l'onirisme
- e) Survient lors d'un raptus anxieux

12. Dans la maladie de Basedow, la symptomatologie psychiatrique est faite :

- a) D'états confusionnels catatoniques
- b) **D'états confusionnels avec agitation**
- c) De troubles maniformes
- d) De troubles dépressifs
- e) De troubles bipolaires

13. Dans les troubles mentaux de la sclérose en plaques, on peut avoir :

- a) Une euphorie paradoxale
- b) Une euphorie naïve
- c) Un sentiment de mal contrastant avec la réalité des déficits neurologiques.
- d) Des tableaux psychotiques
- e) Un délire de persécution

14. Le choix du traitement se fait en fonction :

- a) De ses propriétés pharmacocinétiques
- b) De ses propriétés psychodynamiques
- c) De ses propriétés pharmacodynamiques
- d) De ses propriétés addictogènes
- e) De ses effets recherchés

15. Les antipsychotiques :

- a) Sont essentiellement incisifs
- b) Ne doivent pas être associés à un neuroleptique
- c) Ils peuvent être associés à un correcteur des effets extrapyramidaux
- d) Ils nécessitent une surveillance de la vigilance
- e) Sont incisifs anti délirants, ou anti hallucinatoires

16. Le sommeil:

- a) Est une fonction physiologique
- b) Est une fonction psychologique
- c) Permet la régénérescence physique
- d) Comprend 4 à 8 cycles par nuit
- e) Comprend le sommeil court et le sommeil paradoxal

17. Dans le trouble bipolaire, le but des psychothérapies est de :

- a) Informer le malade sur la maladie
- b) Une évaluation de l'humeur
- c) Permettre une affirmation de soi
- d) Prévoir l'alliance thérapeutique
- e) Permettre au patient de s'adapter aux facteurs de stress

18. Dans le comportement au cours de la vie quotidienne, on apprécie :

- a) Les comportements anti sociaux
- b) Les conduites suicidaires
- c) La variabilité de l'humeur pendant la journée
- d) L'attention
- e) La perception

19. Classiquement, l'attaque de panique :

- a) **Survient brutalement**
- b) **Spontanément**
- c) **Sans raison apparente**
- d) Elle dure moins de 2 minutes
- e) Se termine par une myasthénie

20. Parmi ces médicaments, lequel ou lesquels ne font pas partie des anxiolytiques :

- a) Le chlorazepate dipotassique
- b) **Le chlorhydrate dipotassique**
- c) Alprazolam
- d) **Fluoxétine**
- e) **Dibenzodiazépine**

21. L'épisode dépressif caractérisé se caractérise par :

- a) Humeur expansive
- b) **Perte de poids**
- c) **Gain de poids**
- d) **Diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir**
- e) **Infatigabilité**

22. Dans le suicide la prévention:

- a) se fait par l'hospitalisation
- b) **S'impose dans la tentative de suicide sérieuse**
- c) **Repose sur le traitement de fond de l'affection psychiatrique en cause**
- d) **Se base sur la bonne gestion d'une situation de crise**
- e) **Se fait par La psychothérapie**

23. Parmi ces éléments, lequel ou lesquels ne figurent pas dans les critères de l'état maniaque :

- a) Augmentation de l'estime de soi
- b) **Engagement excessif dans des activités n'ayant pas de conséquences dommageables**
- c) Fuite des idées
- d) **Désir constant de créer**
- e) Une humeur expansive

24. L'évaluation du risque suicidaire repose sur:

- a) **L'appréciation du risque suicidaire**
- b) **Interroger le malade sur ses hospitalisations antérieures**
- c) **L'existence d'un projet précis de suicide**
- d) **Le niveau de souffrance**
- e) **L'existence des traits de personnalité obsessionnelle**

3. 25. Le suicidé est :

- a) **Le sujet dont le geste a été mortel**
- b) Le sujet dont le geste a failli être mortel
- c) Le sujet qui risque de recourir au suicide
- d) Le sujet qui a survécu au suicide
- e) Le sujet qui veut se suicider

26. Selon la classification de Delay et Deniker, les psychotropes comprennent :

- a) **Les psycholeptiques**
- b) Les thymoanaleptiques
- c) **Les psychodysleptiques**
- d) **Les psychoanaleptiques**
- e) Les thymodysleptiques

27. Devant un état suicidaire, l'hospitalisation est:

- a) **Impérative**
- b) **Permet d'assurer une surveillance constante**
- c) **Instaure une relation de confiance avec le milieu hospitalier**
- d) Dépend de la pathologie psychiatrique sous jacente
- e) Exige un bilan paraclinique

28. Parmi ces effets, lequel ou lesquels ne figurent pas dans les effets secondaires des neuroleptiques :

- a) **Hypertension**
- b) Allergies
- c) Tachycardie
- d) **Le syndrome d'hyperventilation aigu**
- e) **Le syndrome interkinétique**

29. Parmi ces éléments, lequel ou lesquels ne figure (ent) pas dans les critères d'un épisode dépressif caractérisé :

- a) **Humeur dépressive toute la journée, presque tous les jours, signalée uniquement par le sujet lui-même.**
- b) Insomnie
- c) Diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir
- d) **Humeur labile**
- e) Hypersomnie

30. Dans le diagnostic étiologique de la bouffée délirante aiguë, on trouve :

- a) **Expérience délirante primaire sans cause**
- b) **Bouffée délirante d'origine toxique**
- c) Bouffée délirante d'origine anxieuse
- d) Bouffée délirante due à la délinquance
- e) Bouffée délirante due des TOC

33- Mr D :

- a) A une perception correcte de sa maladie
- b) A une mauvaise autocritique**
- c) A une réticence pathologique**
- d) N'est pas dangereux pour son entourage
- e) Au contraire, il présente un potentiel dangereux**

34- La situation que Mr D dit <<ressentir>> et qu'il verbalise avec conviction témoigne :

- a) D'une hallucination intrapsychique
- b) D'une intuition délirante**
- c) D'un automatisme mental
- d) D'un rationalisme mental
- e) D'une anxiété anticipatoire

35- Mr D présente :

- a) Des traits de personnalité schizoïde
- b) Des traits de personnalité paranoïaque**
- c) Des traits de personnalité évitante
- d) Des traits de personnalité phobique
- e) Une personnalité dans la normalité

36- Parmi les diagnostics évocables chez Mr D, on peut retenir :

- a) Une schizophrénie
- b) Un trouble schizophréniforme
- c) Un trouble délirant (paranoïaque)**
- d) Une phobie sociale
- e) Un épuisement professionnel (burn out)

37- Devant ce tableau :

- a) L'hospitalisation sous contrainte est nécessaire**
- b) Au contraire, l'hospitalisation ne fait qu'aggraver le sentiment de patient que tout le monde est contre lui
- c) Un traitement ambulatoire avec des suivis réguliers seraient plus adaptés.
- d) Il s'agit d'un conflit professionnel, avec épuisement, et c'est le traitement du médecin de famille qui était adapté
- e) Le traitement lors de l'admission aurait du comporter un antidépresseurs

38- Le Lexomil prescrit par le médecin:

- a) Est un ISRS
- b) Est un tricyclique
- c) Est une benzodiazépine**
- d) Est un neuroleptique atypique
- e) Est un anxiolytique**

39- Le Risperdal :

- a) Est un antidépresseur
- b) Est un anxiolytique
- c) **Est un antipsychotique de seconde génération.**
- d) Est un antipsychotique de première génération.
- e) Est un hypnotique

40- La Co-prescription du Nozinan est justifiée par l'existence :

- a) **D'une insomnie**
- b) **D'une anxiété**
- c) D'une dépression
- d) D'un délire
- e) D'un automatisme mental

Bon Courage

Examen de psychiatrie

RATTRAPAGE

Corrigé type

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. BCDE | 22. A BCDE |
| 2. ABE | 23. BD |
| 3. B | 24. AED ABCD |
| 4. ABC b,e | 25. A |
| 5. BC | 26. ACD |
| 6. E | 27. ABC |
| 7. BCD | 28. ADE |
| 8. C | 29. AD |
| 9. ABE | 30. AB |
| 10. BE | 31. CE |
| 11. B | 32. E |
| 12. BCD | 33. BCE |
| 13. AD | 34. B |
| 14. ACE | 35. B |
| 15. CDE | 36. C |
| 16. AC | 37. A |
| 17. ABE | 38. CE |
| 18. AB | 39. C |
| 19. ABC | 40. AB |
| 20. BDE | |
| 21. BCD | |