

Les Gales notoédriques

Module de : Parasitologie

D'après les cours de Mr.Bencheikh

2010-2011©B_Integra

[HTTP://VETO-CONSTANTINE.COM](http://veto-constantine.com)

I. Gale notoédrique du chat

1. Définition :

C'est une gale localisée essentiellement à la tête, due à l'espèce *Notoedres cati*, très contagieuse, pouvant être à l'origine de véritables épizooties de quartier. Elle atteint les sujets de tout âge, mais surtout les chattons et les animaux déficients, elle est fréquente chez les chats errants.

2. Symptômes et lésions :

La gale débute par une dépilation et un plissement cutané au niveau des bords antérieurs des oreilles puis elle s'étend progressivement sur toute la tête où on note un éclaircissement du pelage, l'apparition de papules, des lésions squameuses et croûteuses et enfin l'installation à une hyperkératose avec formation d'une véritable carapace grise craquelée. Le prurit est souvent modéré. Non traitée, elle gagne le cou, les épaules et les membres. L'extension de la maladie peut entraîner l'apparition d'une conjonctivite et des troubles généraux (amaigrissement, anorexie...).

II. Gale notoédrique du chien

Elle est due à *Notoedres cati*, mais elle est beaucoup plus rare que la gale sarcoptique. La contamination se fait à partir du chat.

Les lésions sont localisées surtout à la tête, au cou et aux membres antérieurs.

III. Gale notoédrique du lapin

Elle est également localisée à la tête, due à *Notoedres cuniculi*, est très hyperkératosique.