

تم تحميل هذا الملف بواسطة موقع بكالوريا الجزائر

Www.Bac-Alg.Com

النهايات – الاشتقاقية

Limites – Dérivésتمرين 1

احسب النهايات للدالة f عند حدود مجموعة تعريفها D_f في كل حالة من الحالات التالية:

$$f(x) = -x^3 + 2x^2 \quad .2 \quad f(x) = 3x^2 + 2|x| + 7 \quad .1$$

$$f(x) = 1 + \frac{3+4x}{1-2x} \quad .4 \quad f(x) = \frac{x^2 + 4x + 4}{x-2} \quad .3$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 4x + 5}{x^2 - 4x - 5} \quad .6 \quad f(x) = \frac{x^4 + 1}{x^2 + x + 1} \quad .5$$

$$f(x) = \frac{3}{(x-4)^2} \quad .8 \quad f(x) = 1 + \frac{3}{x} + \frac{4}{x^2} \quad .7$$

$$f(x) = 1 + \frac{3x}{1-4x^2} \quad .10 \quad f(x) = \frac{-3x^3 + 6x + 4}{x^2 + 2} \quad .9$$

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x \quad .12 \quad f(x) = 3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{1-x} \quad .11$$

$$f(x) = \sqrt{\frac{x}{x-2}} \quad .14 \quad f(x) = \sqrt{x+2} - \sqrt{x-1} \quad .13$$

$$f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 + 2x - 3} \quad .15$$

تمرين 2

احسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^3}{(x+1)^2} \quad .2 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2x + 1 - \frac{4}{x} \right) \quad .1$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+2}{x^2+3x} \quad .4 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2+7x-3}{x^2} \quad .3$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{3x^2+9}}{x} \quad .6 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - \sqrt{x^2+4x}) \quad .5$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2+2x-15}{x-3} \quad .8 \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2-4x}{x-2} \quad .7$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3+8}{x^2-4} \quad .10 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^2+3x-7}{x^2+2x-3} \quad .9$$

تمرين 3

احسب النهايات التالية باستعمال مبرهنة المقارنة:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 3x + \sin 2x \quad .2 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 1 + \sin x \quad .1$$

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} \frac{x}{2 - \sin x} \quad .4 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^2 + x \cos x \quad .3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + \cos x}{1+x} \quad .6 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin 2x^2}{x^2+1} \quad .5$$

$\frac{11}{4}$	8	4	$-\sqrt{3}$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
1	5	$\frac{1}{2}$	12	1	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	-3
		$-\frac{1}{2}$	$+\infty$	3	2	α	$\frac{3}{2}$	2

2	0	$+\infty, -\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
---	---	--------------------	-----------	-----------	-----------



(1) عين العدد الحقيقي a بحيث من أجل كل $x \neq -2$ فإن:

$$f(x) = g(x) + \frac{a}{x+2}$$

(2) احسب $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)]$ ثم فسّر بيانها النتيجة.

تمرين 8

إليك بيانين لدالتين f و g :



(1) بقراءة بيانية عين مجموعة تعريف كل دالة.

(2) خمن النهايات عند حدود مجال تعريف كل دالة.

(3) عين المستقيمات المقاربة لكل منحنى واكتب معادلاتها.

(4) ادرس وضعية (C_g) بالنسبة لمسقيمتها المقارب المائل (Δ) .

(5) ما هو عدد حلول المعادلة $g(x) = 0$ ؟ احصره بين

عددين صحيحين متتابعين.

تمرين 9

لتكن الدالة f معرفة على \mathbb{R} بـ:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{|x|} & x \neq 0 \\ 2 & x = 0 \end{cases}$$

ادرس استمرارية الدالة f عند $x_0 = 0$.

تمرين 4

الدالة f معرفة على $\mathbb{R} - \{3\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{-x^2 + 5x + 5}{x-3}$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

(1) عين الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x-3} \quad x \neq 3$$

(2) احسب النهايات عند حدود مجال التعريف.

(3) بين أن (\mathcal{C}) يقبل مستقيمين مقاربين يطلب تعيين معادلتيهما.

(4) ادرس وضعية (\mathcal{C}) بالنسبة للمسقيم المقارب المائل (Δ) .

$$11; 2; -1$$

تمرين 5

الدالة f معرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{2x^3 - 11x^2 + 25x - 27}{x^2 - 4x + 4}$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

(1) عين الأعداد الحقيقية a ، b ، c و d بحيث من أجل كل

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x-2} + \frac{d}{(x-2)^2} \quad x \neq 2$$

(2) احسب النهايات عند حدود مجال التعريف.

(3) بين أن (\mathcal{C}) يقبل مستقيمين مقاربين يطلب تعيين معادلتيهما.

(4) ادرس وضعية (\mathcal{C}) بالنسبة للمسقيم المقارب المائل (Δ) .

$$-5; 5; -3; 2$$

تمرين 6

نعتبر الدالة f المعرفة على $]-\infty, 0] \cup [2, +\infty[$ بـ:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 2x} - 2x + 1$$

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

(2) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-3x + 2)]$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + x)$.

استنتج وجود مستقيمين مقاربين للمنحنى (\mathcal{C}) الممثل للدالة f .

تمرين 7

- الدالة f معرفة على $\mathbb{R} - \{-2\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^3 + 2x^2 + x - 1}{x+2}$$

- الدالة g معرفة على \mathbb{R} بـ: $g(x) = x^2 + 1$

تمرين 10

لتكن الدالة f معرفة على \mathbb{R} بـ:

$$\begin{cases} f(x) = \frac{|x^2 - 4|}{x + 2} & x \neq -2 \\ f(-2) = -4 \end{cases}$$

(1) ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند $x_0 = -2$.

(2) ادرس استمرارية الدالة f عند $x_0 = -2$.

تمرين 11

لتكن الدالة f معرفة على \mathbb{R} بـ:

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 + 3}{x + 1} & x > 1 \\ f(x) = \sqrt{x^2 + 3} & x \leq 1 \end{cases}$$

(1) بين أن الدالة f مستمرة عند $x_0 = 1$.

(2) ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند $x_0 = 1$. أعط تفسيرا بيانيا للنتيجة.

تمرين 12

احسب مشتق الدالة f في كل حالة من الحالات التالية وذلك بعد تحديد D_f و $D_{f'}$.

$$1. f(x) = x^3 - 4x + 5 \quad 2. f(x) = (x^2 - 1)^3$$

$$3. f(x) = \frac{x^2 + 3x - 4}{x^2 + 3x + 4} \quad 4. f(x) = \frac{3x^2 + 4x - 5}{2x + 1}$$

$$5. f(x) = \frac{4}{(2x + 3)^2} \quad 6. f(x) = \frac{4}{(2 \sin x + 3)^2}$$

$$7. f(x) = \sqrt{3x - 6} \quad 8. f(x) = \sqrt{2 + \cos 2x}$$

$$9. f(x) = x\sqrt{x^2 + 1} \quad 10. f(x) = x + \sin^3(\pi x)$$

$$11. f(x) = \sqrt{x^2 + 4x} \quad 12. f(x) = |x^2 + 4x - 5|$$

تمرين 13

f دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{-2\}$ بـ: $f(x) = \frac{x^2 + \alpha x + \beta}{x + 2}$

عين العددين الحقيقيين α و β بحيث المنحني الممثل للدالة f عند النقطة $(-3, 1)$ يقبل مماسا معامل توجيهه $\frac{2}{3}$.

$$[-7; -3]$$

تمرين 14

الدالة f معرفة على \mathbb{R} بـ: $f: x \mapsto ax^2 + bx + c$

عين الأعداد الحقيقية a ، b و c ($a \neq 0$) بحيث المنحني الممثل للدالة f يشمل النقطة $(0, 3)$ ويقبل مماسا في $\left(\frac{5}{4}, -\frac{1}{8}\right)$ موازيا لحامل محور الفواصل.

$$3; -5; 2$$

تمرين 15

الدالة f معرفة على $\mathbb{R} - \{\frac{3}{2}\}$ بـ: $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{2x - 3}$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

(1) بين أن f قابلة للاشتقاق على مجال تعريفها.

(2) بين أن المنحني (\mathcal{C}) يقبل عند نقطتين A و B مماسين ميل كل منهما يساوي -4 . اكتب عندئذ معادلة كل مماس عند نقطتي التماس A و B .

(3) عين نقطتين C و D من (\mathcal{C}) بحيث يقبل عندهما المنحني (\mathcal{C}) مماسا يشمل النقطة $\left(-3, \frac{4}{25}\right)$.

$(-1, \frac{4}{5}); (-21, -\frac{44}{5})$	$y = -4x + 4$ $y = -4x + 13$	$(1, 0), (2, 5)$
---	---------------------------------	------------------

تمرين 16

الدالة f معرفة على \mathbb{R} بـ: $f(x) = x^3 + mx + 1$

(1) ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m وجود وعدد القيم الحدية للدالة f .

(2) عين قيمة m بحيث المنحني الممثل للدالة f يقبل مماسا معادلته $y = 3x + 1$ عند $x_0 = 0$.

$$3$$

تمرين 17


الدالة f معرفة على \mathbb{R} بـ: $f: x \mapsto x^3 + 3x^2 + 5x + 1$

(1) ادرس تغيرات الدالة f واستنتج أن المعادلة: $f(x) = 0$

تقبل حلا وحيدا α في المجال $I = \left[-\frac{1}{2}, 0\right]$.

(2) هل المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حولا أخرى في \mathbb{R} ؟

(3) استنتج إشارة $f(x)$.



- (1) خمن النهايات عند حدود مجال تعريف كل دالة.
- (2) عين بيانيا: $f(2)$ ، $f'(2)$ ، $g(4)$ و $g'(4)$.
- (3) أنشئ لكل دالة جدول تغيراتها ثم ادرس إشارة $f(x)$.
- (4) اكتب معادلة المماس (Δ) لـ (C_f) عند النقطة A.
- (5) ادرس وضعية المنحني (C_f) بالنسبة للمماس (Δ) .
- (6) ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $g(x) = m$ ؟

- (7) عين الأعداد الحقيقية a, b, c, d بحيث من أجل كل x من D_f فإن: $f(x) = \frac{ax+b}{x^2+cx+d}$

$$d = -3, c = -2, b = 4, a = -2 \quad | \quad 2x - 3y - 4 = 0$$

تمرين 23

لتكن f دالة عددية و (C) تمثيلها البياني، بين أن $x = \alpha$ محور تناظر لـ (C) في كل حالة من الحالات التالية:

- (1) $\alpha = 2$ $f(x) = \frac{2x^2 - 8x + 7}{x^2 - 4x + 3}$
- (2) $\alpha = 1$ $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 5}$
- (3) $\alpha = 3$ $f(x) = 2x^2 - 12x + 2|x - 3| - 7$

تمرين 24

لتكن f دالة عددية و (C) تمثيلها البياني، بين أن النقطة ω مركز تناظر لـ (C) في كل حالة من الحالات التالية:

- (1) $\omega(0, -2)$ $f(x) = x^3 - 3x - 2$
- (2) $\omega(1, 6)$ $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 2}{x - 1}$
- (3) $\omega(-\pi, 0)$ $f(x) = [x + \pi + \tan 3x] \cos x$

تمرين 18

نعتبر الدالة f المعرفة على $[-2, 1[\cup]1, +\infty[$ بـ:

$$f: x \mapsto \frac{1}{x-1} - \sqrt{x+2}$$

- (1) احسب النهايات عند حدود مجال تعريف الدالة f .
- (2) أنشئ جدول تغيرات f . بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1 < \alpha < 2$. استنتج إشارة $f(x)$.
- (3) أعط حصرا للعدد α بتقريب 10^{-1} .

$$1,5 < \alpha < 1,6$$

تمرين 19

الدالة f معرفة على $[-2, 3]$ بـ: $f: x \mapsto x^3 - 3x + 1$
أنشئ جدول تغيرات الدالة f واستنتج عدد حلول المعادلات:

$$f(x) = -5 \quad (1) \quad f(x) = 5 \quad (2) \quad f(x) = 0 \quad (3)$$

تمرين 20

الدالة f معرفة على $D = [1, 3]$ بـ: $f(x) = \frac{8}{(x+1)^2}$

أنشئ جدول تغيرات الدالة f ثم استنتج حصرا للعدد $f(x)$.

تمرين 21

الدالة f معرفة على المجال D . أعط حصرا للعدد $f(x)$ (دون دراسة التغيرات) في كل حالة من الحالات التالية:


$$D = \left[-\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}\right] \quad f(x) = x^2 + 3x \quad 1.$$

$$D = [-3, 0] \quad f(x) = \sqrt{2 - 3x} \quad 2.$$

$$D = [2, 3] \quad f(x) = \frac{-3}{x(x-1)^2} \quad 3.$$

تمرين 22

إليك بياني f و g حيث: $D_g = \mathbb{R}$ و $D_f = \mathbb{R} - \{-1, 3\}$.



دراسة الدوال

Etude de fonctions

ادرس تغيرات كل دالة من الدوال التالية ، ثم ارسم تمثيلها البياني في مستوٍ مزود بمعلم متعامد ومتجانس.

$$]-\infty, 2] \quad f(x) = \sqrt{-2x+4} \quad (15)$$

$$\mathbb{R} \quad f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x^2+1}} \quad (16)$$

$$]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[\quad f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} \quad (17)$$

$$[-4, +\infty[\quad f(x) = (x+1)\sqrt{x+4} \quad (18)$$

$$[-2, 2] \quad f(x) = \sqrt{-x^2+4} \quad (19)$$

$$\mathbb{R} \quad f(x) = \sqrt{x^2-4x+5} \quad (20)$$

$$x \geq \frac{3}{2} \text{ و } x \leq -\frac{1}{2} \quad f(x) = \sqrt{4x^2-4x-3} \quad (21)$$

$$]-\infty, 0] \cup]2, +\infty[\quad f(x) = \sqrt{\frac{x}{x-2}} - 2 \quad (22)$$

$$x \geq \sqrt{2} \text{ و } x \leq -\sqrt{2} \quad f(x) = \sqrt{x^2-2} - x \quad (23)$$

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x &]-\infty, 0[\\ \frac{-2x^2 + 4x}{(x-1)^2} & [0, 1[\cup]1, +\infty[\end{cases} \quad (24)$$

$$\mathbb{R} - \{-3\} \quad f(x) = |x-1| - \frac{4}{x+3} \quad (25)$$

$$\mathbb{R} - \{0\} \quad f(x) = \frac{x^2 + |2x-1|}{x} \quad (26)$$

$$\mathbb{R} \quad f(x) = \sin^2 x - \sin x \quad (27)$$

$$\mathbb{R} \quad f(x) = \sin 2x + 2 \sin x \quad (28)$$

$$-\pi < x < \pi \quad f(x) = \frac{1}{(1 + \cos x)^2} \quad (29)$$

$$\mathbb{R} \quad f(x) = \frac{2x}{x^2+1} \quad (1)$$

$$\mathbb{R} - \{-1, 3\} \quad f(x) = \frac{x^2 - 2x - 15}{x^2 - 2x - 3} \quad (2)$$

$$\mathbb{R} - \{0\} \quad f(x) = x + 1 - \frac{2}{x} \quad (3)$$

$$\mathbb{R} - \{0\} \quad f(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{x^2} \quad (4)$$

$$\mathbb{R} \quad f(x) = \frac{x^2 - 4x + 1}{x^2 - 4x + 5} \quad (5)$$

$$\mathbb{R} - \{1\} \quad f(x) = x - 3 + \frac{1}{x-1} \quad (6)$$

$$\mathbb{R} - \{-1\} \quad f(x) = \frac{2x^2 + 4x}{(x+1)^2} \quad (7)$$

$$\mathbb{R} - \{-1, 3\} \quad f(x) = \frac{2x-7}{x^2-2x-3} \quad (8)$$

$$\mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}, 2\right\} \quad f(x) = \frac{4x^2 - 5x}{2x^2 - 5x + 2} \quad (9)$$

$$\mathbb{R} - \{-1\} \quad f(x) = -x + 2 - \frac{2}{x+1} \quad (10)$$

$$\mathbb{R} - \{0\} \quad f(x) = -2x + 2 - \frac{1}{x^2} \quad (11)$$

$$\mathbb{R} - \{2\} \quad f(x) = 2x + 1 - \frac{1}{(x-2)^2} \quad (12)$$

$$\mathbb{R} - \{0\} \quad f(x) = x^2 - 1 - \frac{2}{x} \quad (13)$$

$$\mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\} \quad f(x) = \frac{2x^3 - 2x^2}{(2x-1)^2} \quad (14)$$

دراسة الدوال

Etude de fonctions

تمرين 1

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1, 3\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{4x^2 - 8x}{x^2 - 2x - 3}$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1- عين الأعداد الحقيقية a, b, c بحيث من أجل كل

$$f(x) = a + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x-3} \quad \text{فإن: } x \neq 3 \text{ و } x \neq -1$$

2- احسب النهايات عند حدود مجال تعريف الدالة f .

- اكتب معادلة لكل من المستقيمات المقاربة للمنحني (\mathcal{C}) .

- ادرس وضعية (\mathcal{C}) بالنسبة للمستقيم المقارب الأفقي.

- ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3- عين A و B نقطتي تقاطع (\mathcal{C}) مع محور الفواصل.

- اكتب معادلتَي المماسين (Δ) و (Δ') للمنحني (\mathcal{C}) عند

النقطتين A و B . عين إحداثيتي نقطة تقاطع (Δ) و (Δ') .

4- أثبت أن المستقيم ذي المعادلة $x=1$ محور تناظر لـ (\mathcal{C}) .

5- احسب $f(-3)$ ، $f(-2)$ ثم ارسم (Δ) ، (Δ') و (\mathcal{C}) .

تمرين 3

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ:

$$f(x) = x - \frac{2}{x+1}$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1- احسب النهايات عند حدود مجال تعريف الدالة f .

- ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

- أثبت أن المستقيم ذي المعادلة: $y=x$ ، مستقيم مقارب

مائل للمنحني (\mathcal{C}) . عين معادلة للمستقيم المقارب الآخر.

- بين أن تقاطع المستقيمان المقاربان مركز تناظر لـ (\mathcal{C}) .

2- عين إحداثيتي النقطتين A و B من (\mathcal{C}) بحيث يكون

ميل المماسين للمنحني (\mathcal{C}) عند هاتين النقطتين يساوي 3.

- اكتب معادلة لكل من المماسين (Δ) و (Δ') للمنحني

(\mathcal{C}) عند النقطتين A و B . ارسم (Δ) و (Δ') .

3- عين نقاط تقاطع (\mathcal{C}) مع المحورين ثم ارسم (\mathcal{C}) .

4- m وسيط حقيقي. ناقش بيانها حسب قيم m عدد

حلول المعادلة: $f(x) = x + m$.

تمرين 4

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{-2, 2\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{\alpha x + \beta}{x^2 - 4} \quad \text{حيث } \alpha \text{ و } \beta \text{ عدنان حقيقيان}$$

1- بين أن الدالة f قابلة للاشتقاق على D_f ثم احسب $f'(x)$.

2- عين العددين الحقيقيين α و β علما بأن المنحني الممثل

للدالة f في مستو مزود بمعلم متعامد ومتجانس يشمل النقطة

$(4; 1)$ وأنه يقبل مماسا ميله $(-\frac{3}{4})$ عند الفاصلة $x_0 = 0$.

في باقي التمرين نعتبر: $\alpha = 3$ و $\beta = 0$.

3- أثبت أن f دالة فردية. ليكن (\mathcal{C}) المنحني الممثل للدالة f

في مستو مزود بمعلم. ماذا تستنتج بالنسبة للمنحني (\mathcal{C}) ؟

4- ادرس تغيرات الدالة f والمستقيمات المقاربة لـ (\mathcal{C}) .

- ادرس وضعية (\mathcal{C}) بالنسبة للمستقيم ذي المعادلة $y = 1$.

- ارسم المنحني (\mathcal{C}) .

5- ناقش حسابيا (جبريا) حسب قيم الوسيط الحقيقي m

عدد حلول المعادلة $f(x) = m$.

لتكن M و M' نقطتي تقاطع (\mathcal{C}) مع المستقيم $y = m$.

احسب بدلالة m إحداثيتي النقطة N منتصف القطعة $[MM']$.

تمرين 2

نعتبر الدالة f المعرفة على \mathbb{R} بـ:

$$f(x) = \frac{-4x + 12}{x^2 - 6x + 10}$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1- احسب النهايات عند حدود مجال تعريف الدالة f .

- اكتب معادلة المستقيم المقارب الأفقي (D) للمنحني (\mathcal{C}) .

- ادرس إشارة $f(x)$ واستنتج وضعية (\mathcal{C}) بالنسبة لـ (D) .

- ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

2- لتكن A نقطة تقاطع المنحني (\mathcal{C}) مع محور الفواصل.

- عين إحداثيتي النقطة A .

- أثبت أن النقطة A مركز تناظر للمنحني (\mathcal{C}) .

- اكتب معادلة المماس (Δ) لـ (\mathcal{C}) عند النقطة A .

3- ارسم المماس (Δ) والمنحني (\mathcal{C}) .

4- m وسيط حقيقي. استعمل المنحني (\mathcal{C}) لدراسة حسب

قيم m عدد حلول المعادلة ذات المجهول الحقيقي x :

$$mx^2 - 2(3m-2)x + 10m - 12 = 0$$

تمرين 5

I- نعتبر الدالة g المعرفة على \mathbb{R} بـ:

$$g(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$$

- 1- بين أن: $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$ وأن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 2$.
- 2- ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم استنتج أنه من أجل كل x من \mathbb{R} فإن $g(x) > 0$.

II- نعتبر الدالة f المعرفة على \mathbb{R} بـ:

$$f(x) = x - 3 + \sqrt{x^2 + 3}$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

- 1- احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -3$.
- 2- بين أنه من أجل كل x من \mathbb{R} فإن: $f'(x) = g(x)$.
- استنتج إنشاء جدول تغيرات الدالة f .
- 3- بين أن (\mathcal{C}) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) معادلته: $y = 2x - 3$. عين معادلة للمستقيم المقارب الآخر (Δ') .
- 4- حل في \mathbb{R} المعادلة: $f(x) = 0$ ثم ارسم (Δ) ، (Δ') و (\mathcal{C}) .
- 5- m وسيط حقيقي. ناقش بيانيا حسب قيم m عدد نقاط تقاطع (\mathcal{C}) مع المستقيمتين (Δ_m) التي معادلاتها: $y = 2x + m$.

تمرين 6

I- نعتبر الدالة g المعرفة على \mathbb{R} بـ:

$$g(x) = x^3 - 3x - 3$$

- 1- ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.
- 2- بين أن المعادلة: $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $2,1 < \alpha < 2,2$.
- 3- استنتج من أجل كل x من \mathbb{R} إشارة $g(x)$.

II- f دالة معرفة على \mathbb{R}^* بـ: $f(x) = x + \frac{3}{x} + \frac{3}{2x^2}$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

- 1- احسب النهايتين: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ و $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} [f(x) - x]$ ثم فسر النتيجةين بيانيا.
- ادرس وضعية (\mathcal{C}) بالنسبة للمستقيم ذي المعادلة $y = x$.
- 2- بين أنه من أجل كل x من \mathbb{R}^* فإن: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$.
- شكل جدول تغيرات الدالة f .
- بين أن $f(\alpha) = \frac{12\alpha + 9}{2\alpha^2}$. استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.
- 3- بين أن (\mathcal{C}) يقبل نقطة انعطاف. ارسم المنحني (\mathcal{C}) .
- 4- بين أنه يوجد مماس لـ (\mathcal{C}) يوازي المستقيم $y = x$.


تمرين 7

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[-5, 2]$ بـ:

$$f(x) = |x^2 + 3x - 4| - 1$$

ليكن المنحني (\mathcal{C}) تمثيلها البياني المبين أسفله.

- 1- ادرس إشارة $x^2 + 3x - 4$ ثم عرف الدالة f بمجالات.
- 2- ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند -4 ، ثم عند 1 .
- استنتج أن المنحني (\mathcal{C}) يقبل أربعة أنصاف مماسات عند نقطتين فاصلتيهما -4 و 1 ، يطلب كتابة معادلة لكل منها.



- 3- بقراءة بيانية أنشئ جدول تغيرات الدالة f .
- استنتج عدد حلول المعادلة $f(x) = 4$.
- خمن وجود محور تناظر يطلب كتابة معادلته.
- احسب: $f(-3-x) - f(x)$ ثم أثبت صحة تخمينك.
- 4- حل في مجموعة الأعداد الحقيقية المعادلة $f(x) = 5$.

الدالة الأسية [I]

Fonction Exponentielle

تمرين 1

حل في المجموعة \mathbb{R} المعادلات التالية:

(1) $e^{2x} - e^x - 20 = 0$

(2) $e^x + 18e^{-x} = 9$

(3) $e^{2x+1} - 3\sqrt{e^{2x+2}} = -e^{1+\ln 2}$

(4) $2e^{5x} - 13e^{3x} - 7e^x = 0$

(5) $e^{3x} - 3e^{2x} - e^x + 3 = 0$

(6) $e^x - (5+e)e^{\frac{x}{2}} + 5e = 0$

$\ln 2, 0$	$\ln 6, \ln 3$	$\ln 5$
$2\ln 5, 2$	$\ln 3, 0$	$\ln \sqrt{7}$

تمرين 2

حل في \mathbb{R} جمل المعادلات التالية:

(1) $\begin{cases} 2e^x + 3e^y = 8 \\ 3e^x - 2e^y = -1 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x + y = 1 \\ e^{2x+1} \times e^{y-1} = 1 \end{cases}$

$(-1; 2) \quad (0; \ln 2)$

تمرين 3

عين في كل حالة مجموعة تعريف

الدالة f ودالتها المشتقة في المجموعة التي تكون فيها قابلة للاشتقاق:

(1) $f(x) = e^x + 3e^{-x+2} - x$

(2) $f(x) = e^{-2x} - e^{-3x} + 4$

(3) $f(x) = \frac{e^x}{e^{2x} - 3}$

(4) $f(x) = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}}$

(5) $f(x) = (x-1)e^x - x^2$

(6) $f(x) = (2x-1)e^{\frac{1}{x}}$

(7) $f(x) = \frac{e^{2x} - 2e^x + 2}{e^x - 1}$

(8) $f(x) = (x^2 + x + 1)e^{-\frac{x}{2}}$

(9) $f(x) = \frac{e^x}{\sqrt{1 - e^{2x}}}$

(10) $f(x) = \sqrt{-4e^{2x} + 4e^x + 3}$

تمرين 4

احسب النهايات التالية:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 1)e^x$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} x + e^{\frac{2x}{x-1}}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0^-} (1-x)e^{\frac{1}{x}} + 2$

(4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} - 2e^x$

(5) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} + e^x - 4$

(6) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - x + 1$

(7) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x} - 1}{x}$

(8) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-1)e^x}{x}$

(9) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{xe^x}{x+1}$

(10) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{e^x + 1}$

(11) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x} + 2}{e^{2x} - 1}$

(12) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{2x} - 2e^x + 3}{e^x - 1}$

(13) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + x - 1}{x}$

(14) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x+1}}{x}$

(15) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 2x + 2)e^x$

(16) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^2 - 4x)e^{-x}$

(17) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1)e^{-x}$

(18) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 2e^x$

(19) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{x^2 + x + 1}$

(20) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)e^{-\frac{x}{2}}$

(21) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-2}{e^x - 2x}$

(22) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{2x}$

(23) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x^2} - 1}{x^2}$

(24) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x}}{x}$

(25) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x^2 + 2x}$

(26) $\lim_{x \rightarrow \ln 3} \frac{e^x - 3}{x - \ln 3}$

(27) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - 2e^{2x} + 1}{4x^2}$

(28) $(X = \frac{1}{x} \text{ ضع } \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{\frac{1}{x}} - x + 1)$

تمرين 5

ادرس تغيرات كل دالة ثم ارسم بيانها:

(1) $f(x) = e^{1-x} - 1$

(2) $f(x) = e^{4x} - 2e^{2x}$

(3) $f(x) = \frac{2e^x - 1}{e^x - 1}$

(4) $f(x) = \frac{3e^x}{e^x + 1}$

(5) $f(x) = (x-2)e^x + 2$

(6) $f(x) = (2x^2 + 3x)e^{-x}$

(7) $f(x) = 2xe^{-\frac{x}{2}}$

(8) $f(x) = e^x - x - 1$

(9) $f(x) = 2e^x - 3e^{-x} - 7x + 2$

(10) $f(x) = \frac{e^{2x} - 2e^x + 2}{e^x - 1}$

(11) $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$

(12) $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$

(13) $f(x) = x + 1 - \frac{1}{e^x - 2}$

(14) $f(x) = x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 1}$

الدالة الأسية [II]

Fonction Exponentielle

تمرين 1

- 1- احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- 2- حل في المجموعة \mathbb{R} المتراجحة: $e^{2x} - 4e^x + 3 > 0$.
ثم استنتج إشارة الدالة $f(x)$ من أجل كل x من \mathbb{R} .
باستعمال القراءة البيانية:
- 3- أعط حصرا سعته 0,2 للعديدين الحقيقيين α و β الموافقين للقيمتين الحديتين المحليتين للدالة f على \mathbb{R} .
- 4- عين قيم كل من: $f'(\alpha)$ ، $f'(0)$ و $f'(\beta)$.
- 5- ادرس وضعية المنحني (\mathcal{C}) بالنسبة للمماس (T).
- 6- لتكن الدالة h المعرفة على $]-\infty; 0[$ بـ: $h(x) = \frac{1}{f(x)}$
- أنشئ جدول تغيرات الدالة f على المجال $]-\infty; 0[$.
- استنتج جدول تغيرات الدالة h .

تمرين 3

- نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[-1; +\infty[$ بـ:
- $$f(x) = (x^2 + x + 2)e^{-x}$$
- ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.
- 1- بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ (نذكر أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-x} = 0$)
حيث n عدد طبيعي). استنتج أن المنحني (\mathcal{C}) يقبل مستقيما مقاربا يطلب كتابة معادلته.
 - 2- (أ) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.
(ب) اكتب معادلة المماس (T) لـ (\mathcal{C}) عند $x_0 = 0$.
(ج) بين أن المعادلة: $f(x) = 3$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $[-1; 0]$. أعط حصرا للعدد α بتقريب 10^{-1} .
 - 3- (أ) بين أن (\mathcal{C}) يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيينهما.
(ب) ارسم المماس (T) والمنحني (\mathcal{C}) .
 - 4- لتكن الدالة g المعرفة على المجال $[-1; +\infty[$ بما يلي: $g(x) = [f(x)]^2$
(أ) بين أن الدالة g عبارة عن مركب دالتين، إحداهما الدالة f أي: $g = u \circ f$ ، يطلب تعيين الدالة u .
(ب) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.
 - 5- أنشئ جدول تغيرات g انطلاقا من جدول تغيرات f .
وسيط حقيقي. نعتبر الدالة f_m المعرفة على \mathbb{R} بـ:
$$f_m(x) = (x^2 + mx + 2)e^{-x}$$

عين قيم m حتى تقبل الدالة f_m قيمتين حديتين محليتين.

نعتبر الدالة f المعرفة على \mathbb{R} بـ: $f(x) = \frac{2 - e^{2x}}{1 + e^{2x}}$
ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

- 1- احسب النهايات عند حدود مجال تعريف الدالة f .
- اكتب معادلة لكل من المستقيمتين المقاربة للمنحني (\mathcal{C}) .
- ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.
- 2- أثبت أن النقطة $\omega(0; \frac{1}{2})$ مركز تناظر للمنحني (\mathcal{C}) .
- اكتب معادلة المماس (T) للمنحني (\mathcal{C}) عند النقطة ω .
- ارسم المماس (T) والمنحني (\mathcal{C}) .
- 3- نعتبر الدالة g المعرفة على \mathbb{R} بـ:

$$g(x) = f(x) + \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$$


- بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$ فإن: $g'(x) = \frac{3(e^{2x} - 1)^2}{2(1 + e^{2x})^2}$
- احسب $g(0)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة g .
- ادرس إشارة $g(x)$ واستنتج وضعية (\mathcal{C}) بالنسبة لـ (T).

تمرين 2

- I- نعتبر الدالة g المعرفة على \mathbb{R} بـ: $g(x) = e^x - x$.
ادرس اتجاه تغير الدالة g ، شكل جدول تغيراتها، ثم بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$ فإن: $g(x) > 0$.
- II- نعتبر الدالة f المعرفة على \mathbb{R} بـ:

$$f(x) = \frac{e^{2x} - 4e^x + 3}{e^x - x}$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$
المبين أسفله، والمستقيم (T) هو المماس لـ (\mathcal{C}) عند المبدأ.



تمارين 4

I- ا و b عدنان حقيقيان ولتكن الدالة g المعرفة على \mathbb{R} :

$$g(x) = (ax + b)e^x - 1$$

تعطى تغيرات الدالة g في الجدول التالي:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	-1	-2	$+\infty$

1- باستغلال الجدول بين أن $a = 1$ و $b = -1$.

2- بين أن المعادلة: $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث:

$1,27 < \alpha < 1,28$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على \mathbb{R} .

II- نعتبر الدالة f المعرفة على \mathbb{R}^* بـ:

$$f(x) = \frac{e^x - 2x + 1}{x}$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1- أثبت أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}^*$ فإن: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

استنتج اتجاه تغير الدالة f على \mathbb{R}^* .

2- احسب النهايات عند حدود مجال تعريف الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3- أثبت أن المنحني (\mathcal{C}) يقبل مستقيمين مقاربين، وأنه يقبل فرعاً لا نهائياً باتجاه حامل محور الترتيب.

4- بين أن $f(\alpha) = -2 + \frac{1}{\alpha - 1}$ ثم أعط حصراً لـ $f(\alpha)$.

5- اكتب معادلة المماس (T) للمنحني (\mathcal{C}) عند $x_0 = 1$.

6- احسب $f(-3)$ ، $f(-1)$ ، $f(\frac{1}{2})$ ، $f(2)$ و $f(3)$ ثم ارسم المماس (T) والمنحني (\mathcal{C}) . (وحدة الرسم: 1cm).

تمارين 5 (بكالوريا)

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على \mathbb{R} بـ:

$$f(x) = 2x + 1 - xe^{x-1}$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1- ادرس نهاية الدالة f عند $-\infty$ ثم عند $+\infty$ (يمكن كتابة $xe^{x-1} = \frac{1}{e}xe^x$).

2- أثبت أن المستقيم Δ ذي المعادلة $y = 2x + 1$ مستقيم مقارب للمنحني (\mathcal{C}) عند $-\infty$ ، ادرس وضعية المنحني (\mathcal{C}) بالنسبة للمستقيم Δ .

3- (أ) احسب المشتقة f' والمشتقة الثانية f'' للدالة f.

(ب) شكل جدول تغيرات f' مع تحديد نهاية f' عند $-\infty$.

ج) احسب $f'(1)$ واستنتج إشارة $f'(x)$ على \mathbb{R} .

د) أنشئ جدول تغيرات الدالة f.

4- ليكن I المجال $[2; 9]$. أثبت أنه على I، المعادلة

$$f(x) = 0$$

تقبل حلاً وحيداً α .

5- ارسم المستقيم Δ والمنحني (\mathcal{C}) (وحدة الرسم: 2cm).

تمارين 6 (بكالوريا بتصرف)

I- نعتبر الدالة g المعرفة على \mathbb{R}^* بـ:

$$g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)e^{\frac{1}{x}} + 1$$

1- احسب النهايات عند حدود مجال تعريف الدالة g.

2- ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.

3- بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}^*$ فإن: $g(x) > 0$.

II- نعتبر الدالة f المعرفة على \mathbb{R} بـ:

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x}{1 + e^{\frac{1}{x}}} & x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1- ادرس استمرارية الدالة f عند $x_0 = 0$.

2- ادرس قابلية اشتقاق f عند $x_0 = 0$ ثم بين أن (\mathcal{C}) يقبل نصفين مماسين Δ و Δ' يطلب كتابة معادلتيهما.

3- أثبت أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}^*$ فإن: $f'(x) = \frac{g(x)}{\left(1 + e^{\frac{1}{x}}\right)^2}$.

استنتج اتجاه تغير الدالة f على \mathbb{R} .

4- احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f.

5- احسب: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - \frac{x}{2} + \frac{1}{4}$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - \frac{x}{2} + \frac{1}{4}$.

(ضع $X = \frac{1}{x}$). استنتج وجود مستقيم مقارب للمنحني (\mathcal{C}) .

6- ارسم Δ ، Δ' والمنحني (\mathcal{C}) . (وحدة الطول 4cm).

7- نعتبر الدالة h المعرفة على \mathbb{R} بـ:

$$\begin{cases} h(x) = \frac{x}{1 + e^{\frac{1}{x}}} & x \neq 0 \\ h(0) = 0 \end{cases}$$

ليكن (\mathcal{C}') تمثيلها البياني في المعلم السابق.

تحقق أن: $h(x) = -f(-x)$ ثم بين أن (\mathcal{C}) و (\mathcal{C}') متناظران بالنسبة للمبدأ. استنتج رسم المنحني (\mathcal{C}') .

المعادلات التفاضلية ودوال القوى

Equation différentielle et Fonction puissance

تمرين 5 Bac S France sept 2007

نعتبر المعادلتين التفاضليتين المعرفتين على $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ بـ:

$$(E_0) \quad y' + y = 1 \quad (E) \quad y' + (1 + \tan x)y = \cos x$$

1- عين مجموعة حلول المعادلة (E_0) .2- f و g دالتان قابلتان للاشتقاق على $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ بحيث

$$f(x) = g(x) \cos x. \text{ بين أن الدالة } f \text{ هي حل للمعادلة}$$

 (E) إذا وفقط إذا الدالة g هي حل للمعادلة (E_0) .3- عين الحل f لـ (E) بحيث $f(0) = 0$.

$(1 - e^{-x}) \cos x$	$C e^{-x} + 1$
-----------------------	----------------

تمرين 6

لتكن $y(t)$ عدد ذرات الراديوم (*radium*) لمادة مشعة في اللحظة t (مقدرة بالسنوات) بحيث:

$$y(0) = y_0 \quad \text{و} \quad y'(t) = -4,33 \times 10^{-4} y(t)$$

1- اكتب عبارة $y(t)$ بدلالة y_0 و t .

2- احسب زمن نصف العمر للراديوم أي الزمن اللازم لتناقص نصف عدد ذرات الراديوم.

1600 ans	$y = y_0 e^{-4,33 \times 10^{-4} t}$
--------------------	--------------------------------------

تمرين 7

لتكن $y(t)$ عدد الجراثيم في مستعمرة في اللحظة t (مقدرة بالساعات) و $y'(t)$ سرعة تكاثر عدد الجراثيم في اللحظة t بحيث:

$$y'(t) = 3y(t)$$

1- إذا علمت أن عدد الجراثيم في اللحظة $t = 0$ هو $N_0 = 1000$. ما هو عددها في اللحظة $t = 1 \text{ h } 30 \text{ mn}$ ؟2- متى يصبح عدد الجراثيم مليون مرة عددها في $t = 0$ ؟

$4 \text{ h } 36 \text{ mn}$	9×10^4	$y = 1000 e^{3t}$
------------------------------	-----------------	-------------------

تمرين 8

حل في \mathbb{R} المعادلتين التاليتين:

$$(1) \quad 3^{2x} - 3^x - 6 = 0 \quad (2) \quad 4^{x-1} - 7 \times 2^x + 24 = 0$$

تمرين 9

ادرس تغيرات الدالة f ثم ارسم بيانها في معلم معين:

$$(1) \quad f(x) = 3^x \quad (2) \quad f(x) = 2^x + 2^{-x}$$

تمرين 1

1- حل المعادلة التفاضلية التالية: $2y' + 3y = 0$.- عين الحل f الذي يحقق: $f(0) = 8$.2- عين الدالة h حلا للمعادلة التفاضلية التالية:

$$y' - 2y + 4 = 0 \text{ بحيث } h \text{ تتعدم عند } -\ln 3.$$

$-18e^{2x} + 2$	$8e^{-\frac{3}{2}x}$	$Ce^{-\frac{3}{2}x}$
-----------------	----------------------	----------------------

تمرين 2

1- حل المعادلة التفاضلية التالية: $y' - 2y = 0$ (E).2- نعتبر المعادلة التفاضلية التالية: $y' - 2y = e^x$ (F).عين العددين الحقيقيين a و b حتى تكون الدالة g المعرفة على \mathbb{R} بـ: $g(x) = ae^x + b$ حلا للمعادلة (F).3- بين أن h هي حل للمعادلة (E) إذا وفقط إذا $f = g + h$ هي حل للمعادلة (F). استنتج حلول المعادلة (F).

4- من بين حلول المعادلة (F) عين تلك التي تمثيلها البياني في معلم يمر من المبدأ.

$e^{2x} - e^x$	$Ce^{2x} - e^x$	$-e^x$	Ce^{2x}
----------------	-----------------	--------	-----------

تمرين 3

1- حل المعادلة التفاضلية التالية: $y' + 2y = 0$ (E).2- نعتبر المعادلة التفاضلية: $y' + 2y = 5 \cos x$ (F).عين العددين الحقيقيين a و b حتى تكون الدالة g المعرفة على \mathbb{R} بـ: $g(x) = a \cos x + b \sin x$ حلا للمعادلة (F).3- بين أن f هي حل للمعادلة (F) إذا وفقط إذا $f - g$ هي حلا للمعادلة (E). استنتج حلول المعادلة (F).

$Ce^{-2x} + 2 \cos x + \sin x$	$2 \cos x + \sin x$	Ce^{-2x}
--------------------------------	---------------------	------------

تمرين 4

1- حل المعادلة التفاضلية التالية: $2y' + y = 0$ (I).2- نعتبر المعادلة التفاضلية: $2y' + y = x^2 + 3x$ (II).بين الدالة g المعرفة على \mathbb{R} بـ: $g(x) = x^2 - x + 2$ هي حلا للمعادلة التفاضلية (II).3- بين أن h هي حل للمعادلة (II) إذا وفقط إذا $h - g$ هي حلا للمعادلة (I). استنتج حلول المعادلة (II).4- من بين حلول المعادلة (II) عين تلك التي بيانها يقبل مماسا عند $x_0 = 0$ موازيا للمستقيم ذي المعادلة $y = x$.

$-4e^{-\frac{x}{2}} + x^2 - x + 2$	$Ce^{-\frac{x}{2}} + x^2 - x + 2$	$Ce^{-\frac{x}{2}}$
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------

الدالة اللوغاريتمية [I]

Fonction logarithme

تمرين 1

عَيِّن مجموعة تعريف الدالة f حيث:

$$f(x) = x - \ln(2x - 3) \quad (1)$$

$$f(x) = x - 1 + \ln|2 - x| \quad (2)$$

$$f(x) = \frac{x}{x+1} - \ln x^2 \quad (3)$$

$$f(x) = \frac{2x}{2x-1} - \ln \sqrt{x+1} \quad (4)$$

$$f(x) = \frac{1}{x} - \ln(x^2 - 4) \quad (5)$$

$$f(x) = x + 1 + \ln(x - 4)^2 \quad (6)$$

$$f(x) = \ln(-x^2 - x + 2) \quad (7)$$

$$f(x) = 2x - 1 + \ln\left(\frac{x}{x-1}\right) \quad (8)$$

$$f(x) = \ln x + \ln(x - 1) \quad (9)$$

$$f(x) = \frac{1}{x} + \ln\left(\frac{2+x}{2-x}\right) \quad (10)$$

$$f(x) = 2x + 3 + \ln\left|1 + \frac{3}{x}\right| \quad (11)$$

$$f(x) = \frac{x}{\ln(x+1)} \quad (12)$$

$$f(x) = \sqrt{1 - \ln x} - \ln(x^2 + 1) \quad (13)$$

$$f(x) = \frac{1 + \ln x}{1 - |\ln x|} \quad (14)$$

تمرين 2

حل في المجموعة \mathbb{R} المعادلات التالية:

$$\ln(2x - 3) = \ln(x - 3) + \ln 5 \quad (1)$$

$$\ln(x^2 - 5) - \ln(4 - x) = 2 \ln 2 \quad (2)$$

$$\ln|x - 4| + \ln(7 - 3x) = \ln 2 \quad (3)$$

$$\ln x^2 - \ln \sqrt{x} - 6 = 0 \quad (4)$$

$$(\ln x)^2 - \frac{5}{2} \ln x + 1 = 0 \quad (5)$$

$$(\ln x)^4 - 10(\ln x)^2 + 9 = 0 \quad (6)$$

$$(\ln x)^3 + 3(\ln x)^2 - 4 = 0 \quad (7)$$

$$\ln(\sin x) + \ln(\cos x) = \ln \frac{\sqrt{3}}{4} \quad (8)$$

تمرين 3

حل في \mathbb{R} جمل المعادلات التالية:

$$\begin{cases} \ln x + \ln y = \ln 10 \\ x + y = 7 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \ln(x+1) + 2 \ln(y-2) = 4 \\ 3 \ln(x+1) - \ln(y-2) = 5 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} \ln x + \ln y = 1 \\ \frac{3}{\ln x} - \frac{2}{\ln y} = 2 \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{array}{|l|l|} \hline (e^2 - 1; e + 2) & (5; 2), (2; 5) \\ \hline (\sqrt{e}; \sqrt{e}) & (e^3; e^{-2}) \\ \hline \end{array}$$

تمرين 4

عَيِّن الدالة المشتقة للدالة f في المجموعة التي تكون فيها قابلة للاشتقاق:

$$f(x) = \ln(x^2 + 4x - 5) \quad (1)$$

$$f(x) = 2x - 1 + \ln|2x - 1| \quad (2)$$

$$f(x) = \ln(-x) + \ln \sqrt{2x + 3} \quad (3)$$

$$f(x) = \frac{1 + 2 \ln x}{x + 1} \quad (4)$$

$$f(x) = \frac{1 + \ln x^2}{x + 1} \quad (5)$$

$$f(x) = x \ln x - \ln(\ln x) \quad (6)$$

$$f(x) = x + \ln\left(\frac{2x-1}{2x+1}\right) \quad (7)$$

$$f(x) = \sqrt{\ln x} + (\ln x)^2 \quad (8)$$

تمرين 5

احسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x + \ln(2x + 3) \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(x^2 + x - 2) \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + \ln x}{x^2} \quad (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x - x \quad (4)$$

$$(X = -x) \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x - 1 + \ln(-x) \quad (5)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln x}{x + 1} \quad (6)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+1}{x} + \ln x \quad (7)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \quad (8)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x + \ln\left(\frac{x}{x-2}\right) \quad (9)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} x + \ln\left(\frac{x-2}{x+2}\right) \quad (10)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} x + \ln\left(\frac{2+x}{2-x}\right) \quad (11)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln\left|\frac{x+1}{x^2-4}\right| \quad (12)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+2)}{x} \quad (13)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 3)}{x} \quad (14)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x^2} \quad (15)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{(x+1)^2} \quad (16)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x^2 - x \quad (17)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x - \sqrt{x} \quad (18)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \ln(1-x) \quad (19)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x^2 - 1) - \ln(x + 2) \quad (20)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 2 - \ln(x - 1) \quad (21)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - \ln x}{x + \ln x} \quad (22)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x+1)}{x^2} \quad (23)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(2x+1)}{x} \quad (24)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x-1)}{x-2} \quad (25)$$

$$(X = \frac{1}{x}) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \quad (26)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \quad (27)$$

الدالة اللوغاريتمية [II]

Fonction logarithme

تمرين 1

I- نعتبر الدالة f المعرفة على $]-3; 1[$ بـ:

$$f(x) = a \ln(3+x) + b \ln(1-x) - 2$$

حيث a و b عدنان حقيقيان.عين العددين الحقيقيين a و b بحيث يقبل منحنى الدالة f عند النقطة $(0; -2+3\ln 3)$ مماسا موازيا لحامل محور الفواصل.II- نعتبر الدالة f المعرفة على $]-3; 1[$ بـ:


$$f(x) = 3 \ln(3+x) + \ln(1-x) - 2$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.1- احسب $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$. استنتج أن المنحنى (\mathcal{C}) يقبل مستقيمين مقاربين يطلب كتابة معادلتيهما.- ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.- هل المنحنى (\mathcal{C}) يقبل نقطة انعطاف؟ برّر إجابتك.2- (T) هو المماس لـ (\mathcal{C}) عند النقطة ذات الفاصلة x_0 .

اكتب معادلة للمستقيم (T) إذا كان معامل توجيهه يساوي 1.

3- أثبت أن المنحنى (\mathcal{C}) يقطع محور الفواصل عند نقطتينفاصلتيهما α و β حيث: $-2 < \alpha < -1$ و $0,5 < \beta < 1$.- ارسم المستقيم (T) والمنحنى (\mathcal{C}) . (وحدة الطول 2cm)4- ناقش جبريا حسب قيم الوسيط الحقيقي m ($m > 0$)عدد جذور المعادلة: $f(x) = 2 \ln(3+x) - 2 + \ln m$

تمرين 2

ليكن (\mathcal{C}_f) و (\mathcal{C}_g) بياني الدالتين f و g على $]-3; +\infty[$.1- ضع تخمينا بالنسبة لـ: (أ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.(ب) ادرس اتجاه تغير كل من f و g على $]-3; +\infty[$.(ج) إشارة كل من $f(x)$ و $g(x)$ على $]-3; +\infty[$.2- نعتبر الدالتين f و g المعرفتين على $]-3; +\infty[$ بـ:

$$f(x) = \ln(x+1) - x + \frac{x^2}{2} \quad \text{و} \quad g(x) = \ln(x+1) - x$$

(أ) احسب النهايتين: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.(ب) ادرس اتجاه تغير كل من f و g على $]-3; +\infty[$.(ج) استنتج إشارة كل من $f(x)$ و $g(x)$ على $]-3; +\infty[$. هل تخمينك السابق كان صحيحا؟

3- (أ) استنتج من الأسئلة السابقة أنه من أجل كل عدد

$$x \text{ حقيقي } x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(x+1) \leq x$$

(ب) استنتج القيمة التقريبية إلى 10^{-3} بالزيادة للعدد $\ln(1,1)$.

تمرين 3

I- نعتبر الدالة g المعرفة على $]-3; +\infty[$ بـ:

$$g(x) = x^2 + 2 - 2 \ln x$$

ادرس اتجاه تغير الدالة g ، شكل جدول تغيراتها، ثم بين أنهمن أجل كل $x > 0$ فإن: $g(x) > 0$.II- نعتبر الدالة f المعرفة على $]-3; +\infty[$ بـ:

$$f(x) = \frac{x}{2} + \frac{\ln x}{x}$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.1- احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. استنتج أن المنحنى (\mathcal{C}) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما (Δ) معادلته $y = \frac{x}{2}$.ادرس وضعية المنحنى (\mathcal{C}) بالنسبة للمستقيم (Δ) .- ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.(يمكن كتابة $f'(x)$ بدلالة $g(x)$)2- برهن أن المنحنى (\mathcal{C}) يقطع محور الفواصل عند نقطةفاصلتها α حيث: $0,7 < \alpha < 0,8$.3- برهن أن (\mathcal{C}) يقبل نقطة انعطاف، يطلب تعيينها.4- اكتب معادلة المماس (T) لـ (\mathcal{C}) والذي يوازي (Δ) .- هل المنحنى (\mathcal{C}) يقبل مماسا يشمل المبدأ؟ علل.- ارسم (Δ) ، (T) و (\mathcal{C}) . (وحدة الطول 2cm)5- ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول

$$mx - \ln x = 0$$

$$6- h \text{ دالة معرفة على } \mathbb{R}^* \text{ بـ: } h(x) = \frac{x}{2} + \frac{\ln|x|}{x}$$

أثبت أن h فردية ثم ارسم بيانها (\mathcal{C}) في المعلم السابق.

تمارين 4

نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ:

$$f(x) = \frac{x+1+\ln x}{x}$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1- احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. استنتج أن المنحني

(\mathcal{C}) يقبل مستقيمين مقاربين يطلب كتابة معادليهما.

2- ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3- ادرس وضعية المنحني (\mathcal{C}) بالنسبة للمستقيم ذي المعادلة $y = 1$ مع تحديد نقطة تقاطعهما.

4- أثبت أن المنحني (\mathcal{C}) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها.

5- تحقق أن المنحني (\mathcal{C}) يقطع محور الفواصل في نقطة

وحيدة فاصلتها α حيث $\frac{1}{4} < \alpha < \frac{1}{3}$. ادرس إشارة $f(x)$.

6- احسب $f(2)$ و $f(4)$ ثم ارسم (\mathcal{C}) . (الوحدة 2cm)

7- لتكن الدالة h المعرفة على \mathbb{R} بـ: $h(x) = f(e^x)$.

احسب $h'(x)$ وذلك دون كتابة عبارة $h(x)$.

تمارين 5

نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ:

$$f(x) = x + 1 + 2 \ln \left(\frac{x+2}{x+1} \right)$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1- احسب النهايات عند حدود مجال تعريف الدالة f .

2- ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3- أثبت أن المنحني (\mathcal{C}) يقبل 3 مستقيمتين مقاربة أحدهم

(Δ) معادلته $y = x + 1$. ادرس وضعية (\mathcal{C}) بالنسبة لـ (Δ) .

4- أثبت أن النقطة $\omega(-\frac{3}{2}; -\frac{1}{2})$ مركز تناظر لـ (\mathcal{C}) .

5- ارسم المستقيم (Δ) والمنحني (\mathcal{C}) . (وحدة الطول 1cm)

6- برهن على وجود مماسين للمنحني (\mathcal{C}) معامل توجيه

كل منهما يساوي $\frac{2}{3}$ ثم اكتب معادلتَي هذين المماسين.

تمارين 6

I- نعتبر الدالة g المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ:

$$g(x) = 4(\ln x - 1) + x$$

1- ادرس اتجاه تغير الدالة g ، شكل جدول تغيراتها.

2- بين أن المعادلة: $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث:

$1,7 < \alpha < 1,8$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $]0; +\infty[$.

II- نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ:

$$f(x) = \left(\frac{x-4}{x} \right) \ln x$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1- أثبت أنه من أجل كل $x > 0$ فإن: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

استنتج اتجاه تغير الدالة f على $]0; +\infty[$.

2- احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. شكل جدول تغيرات f .

3- احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - \ln x$. ماذا يمكن قوله عن المنحني

(\mathcal{C}) والمنحني (\mathcal{C}') الممثل للدالة \ln ؟

- ادرس وضعية المنحني (\mathcal{C}) بالنسبة للمنحني (\mathcal{C}') .

4- بين أن $f(\alpha) = -\frac{(\alpha-4)^2}{4\alpha}$ ثم أعط حصرا لـ $f(\alpha)$.

5- ارسم (\mathcal{C}) و (\mathcal{C}') . $\|\vec{j}\| = 2\|\vec{i}\| = 2\text{cm}$.

تمارين 7

نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ:

$$\begin{cases} f(x) = x^2 + 2x - 2\ln(1-2x) & -4 \leq x \leq 0 \\ f(x) = \ln\left(\frac{1+e^x}{2}\right) & x > 0 \end{cases}$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1- احسب $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$. يمكن وضع $X = -2x$.

- أثبت أن $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{1}{2}$.

- ماذا يمكن قوله عن قابلية اشتقاق الدالة f عند الصفر؟

أعط تفسيراً هندسياً للنتيجة المحصل عليها.

2- بين أن $f(x) = x - \ln 2 + \ln(1+e^{-x})$ لما $x > 0$.

- استنتج أن المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x - \ln 2$

مستقيم مقارب مائل للمنحني (\mathcal{C}) عند $+\infty$.

3- ادرس تغيرات الدالة f على $]0; +\infty[$.

- بين أن المعادلة: $f(x) = 0$ تقبل حلين، أحدهما معدوم

والآخر α يطلب حصره بـ $\frac{-n-1}{2}$ و $\frac{-n}{2}$. n عدد طبيعي.

- ارسم المستقيم (Δ) والمنحني (\mathcal{C}) . (وحدة الطول 2cm)

4- نعتبر الدالة g_m المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ:

$$g_m(x) = 1 + m f(x) \quad (m \text{ وسيط حقيقي غير معدوم})$$

بين أن جميع المنحنيات (\mathcal{C}_m) الممثلة للدالة g_m تشمل

نقطتين ثابتتين $(0; 1)$ و $(\alpha; 1)$.

الجداء السلمي

Produit scalaire

تمرين 4

في الفضاء المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نعتبر النقاط: $A(1;0;2)$ ، $B(0;3;-3)$ و $C(-1;1;2)$.

- 1- بين أن النقاط A ، B و C تعين مستويا.
- 2- اكتب معادلة ديكارتية للمستوي \mathcal{P}_1 الذي يشمل النقطة A و \vec{BC} شعاع ناظمي له.
- 3- اكتب معادلة ديكارتية لـ \mathcal{P}_2 الذي يشمل A ، B و C .
- 4- اكتب معادلة ديكارتية للمستوي \mathcal{P}_3 الذي يوازي المستوي ذي المعادلة: $x+y=3$ ويشمل النقطة C .
- 5- اكتب معادلة ديكارتية للمستوي \mathcal{P}_4 منصف القطعة $[AB]$.

$-2x+6y-10z-13=0$	$x+y=0$	$x+2y+z-3=0$	$x+2y-5z+9=0$
-------------------	---------	--------------	---------------

تمرين 5

في الفضاء المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نعتبر النقطتين: $A(2;1;3)$ و $B(-1;-2;0)$. في نفس المعلم لتكن المستويات التالية: $\mathcal{P}_1: x+y+z=2$ ،

$\mathcal{P}_2: x+2z=0$ و $\mathcal{P}_3: 2x-y-z=4$

1- عين إحداثيات الأشعة النازمية: \vec{n}_1 ، \vec{n}_2 و \vec{n}_3 للمستويات \mathcal{P}_1 ، \mathcal{P}_2 و \mathcal{P}_3 على الترتيب.

2- بين أن \mathcal{P}_1 و \mathcal{P}_3 متعامدان. هل \mathcal{P}_1 يوازي \mathcal{P}_2 ؟ علل.

3- بين أن المستقيم (AB) يعامد المستوي \mathcal{P}_1 .

4- احسب البعد بين النقطة A و \mathcal{P}_1 وبين النقطة A و \mathcal{P}_3 .

استنتج البعد بين النقطة A والمستقيم (Δ) تقاطع \mathcal{P}_1 مع \mathcal{P}_3 .

$2\sqrt{2}$	$\frac{4}{\sqrt{6}}$	$\frac{4}{\sqrt{3}}$
-------------	----------------------	----------------------

تمرين 6 بكالوريا الجزائر 2008

لكل سؤال من الأسئلة التالية جواب واحد صحيح فقط. عين الجواب الصحيح معللا اختيارك. نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ النقاط:

$A(1;3;-1)$ ، $B(4;1;0)$ ، $C(-2;0;-2)$ ، $D(3;2;1)$

والمستوي (P) الذي معادلته: $x-3z-4=0$.

1- المستوي (P) هو:

(1ج) (BCD) ، (2ج) (ABC) ، (3ج) (ABD)

2- شعاع ناظمي للمستوي (P) هو:


(1ج) $\vec{n}_1(1,2,1)$ ، (2ج) $\vec{n}_2(-2,0,6)$ ، (3ج) $\vec{n}_3(2,0,-1)$

3- المسافة بين النقطة D والمستوي (P) هي:

(1ج) $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ، (2ج) $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ، (3ج) $\frac{2\sqrt{10}}{5}$

تمرين 1

ABCDEFGH مكعب ضلعه a .



1- احسب الجداء السلمي بدلالة a لكل من:

$\vec{AC} \cdot \vec{DF}$ ، $\vec{AB} \cdot \vec{CH}$ ، $\vec{AB} \cdot \vec{DG}$ ، $\vec{AB} \cdot \vec{BF}$ ، $\vec{AG} \cdot \vec{DF}$ ، $\vec{AG} \cdot \vec{EG}$ ، $\vec{AC} \cdot \vec{AG}$

2- بين أن $\vec{DF} \cdot \vec{EG} = 0$ و أن $\vec{DF} \cdot \vec{EB} = 0$. استنتج

أن المستقيم (DF) عمودي على المستوي (BEG) .

3- عين طبيعة المثلث DBG واحسب مساحته. ($a=2\text{cm}$)

$2\sqrt{3} \text{ cm}^2$	a^2	$2a^2$	$2a^2$	0	$-a^2$	a^2	0
--------------------------	-------	--------	--------	-----	--------	-------	-----

تمرين 2

في الفضاء المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نعتبر النقاط: $A(2;-1;1)$ ، $B(3;-1;0)$ ،

$C(1;-1;0)$ و $D(2;5;1)$.

1- احسب $\vec{CA} \cdot \vec{CB}$ ، $\|\vec{CA}\|$ و $\|\vec{CB}\|$. استنتج

بالراديان قيمة الزاوية $\angle ACB$.

2- احسب $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ ، $\|\vec{AB}\|$ و $\|\vec{AC}\|$. استنتج

طبيعة المثلث ABC . احسب مساحته.

3- بين أن المستقيم (AD) عمودي على المستوي (ABC) .

4- احسب حجم رباعي الوجوه $ABDC$.

$2u \cdot v$	$1u \cdot a$	$\frac{\pi}{4}$
--------------	--------------	-----------------

تمرين 3

في الفضاء المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نعتبر النقاط: $A(3;-2;0)$ ، $B(-1;0;4)$ ،

$C(1;-4;8)$ و $D(5;-6;4)$.

1- بين أن $\vec{AB} = \vec{DC}$ وأن المستقيم (AB) يعامد (BC) .

2- احسب $\|\vec{AB}\|$ و $\|\vec{BC}\|$. استنتج طبيعة الشكل $ABCD$.

3- اكتب معادلة ديكارتية للمستوي $(ABCD)$.

$2x+2y+z=2$

تمرين 7

- اكتب المعادلة الديكارتية لسطح الكرة في كل حالة مما يلي:
- S_1 : كرة مركزها $\Omega(1;0;-2)$ ونصف قطرها $r = \sqrt{3}$.
- S_2 : كرة مركزها $\Omega(0;1;1)$ وتشمل النقطة $A(2;0;-3)$.
- S_3 : كرة قطرها $[AB]$ حيث $A(-1;-2;0)$ و $B(0;1;2)$.
- S_4 : كرة مركزها $\Omega(1;2;0)$ والمماسية للمستوي $x+2y=0$.

$x^2+y^2+z^2-2x-4y=0$	$x^2+y^2+z^2+x+y-2z-2=0$	$x^2+y^2+z^2-2y-2z-19=0$	$x^2+y^2+z^2-2x+4z+2=0$
-----------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

تمرين 8


- في الفضاء المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نعتبر النقاط: $\Omega(1;0;1)$ ، $A(-1;2;-1)$ ، $B(3;2;3)$ والمستوي \mathcal{P} الذي معادلته: $x - y + z + 4 = 0$.

- احسب بعد النقطة Ω عن المستوي \mathcal{P} .
- اكتب المعادلة الديكارتية لسطح الكرة (S) التي مركزها Ω والمماسية للمستوي \mathcal{P} .
- بين أن النقطة A تنتمي إلى المستوي \mathcal{P} .
- احسب المسافة ΩA . استنتج نقطة تماس (S) و \mathcal{P} .
- اكتب المعادلة الديكارتية للمستوي \mathcal{P}' المماس للكرة (S) عند النقطة B .
- عين مركز ونصف قطر كرة (S') معادلتها الديكارتية: $x^2+y^2+z^2+2x-2y-2z-1=0$. هل (S') تقطع \mathcal{P} ؟ علل.

$x + y + z - 8 = 0$	$x^2+y^2+z^2-2x-2z-10=0$	$2\sqrt{3}$
---------------------	--------------------------	-------------

تمرين 9

- $ABCDE$ هرم قاعدته المربع $ABCD$ الذي مركزه O بحيث: $OA=a$ و $EA=EB=EC=ED=2a$.



- بين أن المستقيم (EO) يعامد المستوي $(ABCD)$.
- عين المجموعات (E_1) ، (E_2) و (E_3) للنقط M بحيث:

$$(E_1) \quad MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 = 8a^2$$

$$(E_2) \quad \|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD}\| = 4\|\vec{ME}\|$$

$$(E_3) \quad (\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD}) \cdot \vec{ME} = 0$$

كرة مركزها O و $r=a$	المستوي محور $[OE]$	كرة قطرها $[OE]$
------------------------	---------------------	------------------

تمرين 10

- في الفضاء المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ لتكن النقاط: $A(0;0;2)$ ، $B(1;2;3)$ و $C(-1;-1;0)$.

- عين G مرجح الجملة: $\{(A,1); (B,2); (C,-1)\}$.
- نعتبر الشعاع: $\vec{u} = \vec{MA} + \vec{MB} - 2\vec{MC}$. بين أن \vec{u} مستقل عن النقطة الكيفية M . بين أن $\vec{u}(3;4;5)$.
- عين المجموعتين (E) و (F) للنقط M بحيث:

$$(E) \quad \|\vec{MA} + 2\vec{MB} - \vec{MC}\| = \|\vec{MA} + \vec{MB} - 2\vec{MC}\|$$

$$(F) \quad (\vec{MA} + 2\vec{MB} - \vec{MC}) \cdot (\vec{MA} + \vec{MB} - 2\vec{MC}) = 0$$

المستوي الذي يمر من G وشعاعه الناظمي \vec{u}	كرة مركزها G و $r = \frac{5\sqrt{2}}{2}$	$G(\frac{3}{2}; \frac{5}{2}; 4)$
--	--	----------------------------------

تمرين 11

- أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير من أجل ما يلي:
- في الفضاء المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نعتبر النقاط: $A(1;2;0)$ ، $B(0;3;0)$ ، $C(-1;0;-2)$ والمستوي \mathcal{P} الذي معادلته: $x + y - 2z - 3 = 0$.

- المعادلة الديكارتية للمستوي (ABC) هي المستوي \mathcal{P} .
- المعادلة الديكارتية للمستوي \mathcal{P}' العمودي على المستوي \mathcal{P} والذي يشمل النقطتين A و B هي $x + y + z - 3 = 0$.
- المثلث ABC قائم في A ومتساوي الساقين.
- سطح الكرة التي مركزها $\Omega(0;-1;1)$ ونصف قطرها $r = 2\sqrt{3}$ مماسية للمستوي \mathcal{P} .

- المسقط العمودي للنقطة $D(1;2;2)$ على المستوي (ABC) هي النقطة $E(\frac{5}{3}; \frac{8}{3}; \frac{2}{3})$.

- حجم رباعي الوجوه $ABCD$ يساوي $\frac{4}{3}$.

- مجموعة النقط M من الفضاء حيث: $\|\vec{MA} + \vec{MB}\| = \|\vec{MA} - \vec{MB}\|$ هي سطح الكرة التي مركزها $I(\frac{1}{2}; \frac{5}{2}; 0)$ ونصف قطرها $r = 2\sqrt{2}$.

خطأ 4	خطأ 7	صحيح 1	صحيح 5	خطأ 3	صحيح 6	صحيح 2
-------	-------	--------	--------	-------	--------	--------

المستقيمات والمستويات

Droites et Plans dans l'espace

تمرين 1

- ليكن الفضاء المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
- 1- أعط تمثيلا وسيطيا للمستقيم d_1 الذي يشمل النقطة $A(2; 1; -1)$ و $\vec{u}(1; -2; 3)$ شعاع توجيه له.
- 2- أعط تمثيلا وسيطيا للمستقيم d_2 الذي يشمل النقطتين $B(3; 2; 2)$ و $C(2; 3; -1)$. هل d_2 يشمل $D(3; 2; 0)$ ؟
- 3- عين إحداثيات النقطة I تقاطع المستقيمين d_1 و d_2 .
- 4- نعتبر المستقيم d_3 الذي تمثيله الوسيطى:

$$\begin{cases} x = -2\lambda + 1 \\ y = 4\lambda - 3 \\ z = \lambda + 5 \end{cases} \quad \lambda \text{ عدد حقيقي}$$

هل d_1 و d_3 متوازيان؟ متقاطعان؟ ليسا من نفس المستوي؟

$$(0; 5; -7) \quad (-\alpha+3; \alpha+2; -3\alpha+2) \quad (t+2; -2t+1; 3t-1)$$

تمرين 2

- في الفضاء المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نعتبر المستويات التالية: $\mathcal{P}_1: x - 2y + z - 3 = 0$ ، $\mathcal{P}_2: -2x + y + z = 0$ و $\mathcal{P}_3: x + y + z - 6 = 0$.
- 1- بين أن المستويين \mathcal{P}_1 و \mathcal{P}_2 يتقاطعان. عين التمثيل الوسيطى للمستقيم \mathcal{D} تقاطع المستويين \mathcal{P}_1 و \mathcal{P}_2 .
- 2- بين أن \mathcal{P}_3 و \mathcal{D} يتقاطعان في نقطة I يطلب تعيينها.
- 3- استنتج مما سبق مجموعة حلول الجملة التالية:

$$\begin{cases} x - 2y + z - 3 = 0 \\ -2x + y + z = 0 \\ x + y + z - 6 = 0 \end{cases}$$

$$(2; 1; 3) \quad (t-1; t-2; t)$$

تمرين 3

فسر هندسيا الجملتين التاليتين واستنتج مجموعة الحلول في \mathbb{R}^3 .

$$S_2 \begin{cases} x + 2y + 3z = 9 \\ 3x - y - z = -2 \\ -x + 5y + 3z = 0 \end{cases} \quad S_1 \begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x + y + z = 0 \\ 4x + 2y - 2z = 7 \end{cases}$$

$$(0; -3; 5) \quad \phi$$

تمرين 4 Bac S France 2007

الفضاء مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نعتبر المستويين: $\mathcal{P}: x + 2y - z + 1 = 0$ و $\mathcal{P}': -x + y + z = 0$. لتكن النقطة $A(0; 1; 1)$.

1- بين أن المستويين \mathcal{P} و \mathcal{P}' متعامدان.

2- نعتبر المستقيم d الذي تمثيله الوسيطى:

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{3} + t \\ y = -\frac{1}{3} \\ z = t \end{cases} \quad t \text{ عدد حقيقي}$$

بين أن المستويين \mathcal{P} و \mathcal{P}' يتقاطعان وفق المستقيم d .

3- احسب بعد النقطة A عن كل من المستويين \mathcal{P} و \mathcal{P}' .

4- استنتج المسافة بين النقطة A والمستقيم d .

$$\sqrt{2}, 2/\sqrt{3}, 2/\sqrt{6}$$

تمرين 5 Bac S Nouvelle-Calédonie 2007

الفضاء مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

- 1- اكتب المعادلة الديكارتية للمستوي الذي يشمل النقطة $M_0(x_0; y_0; z_0)$ و $\vec{n}(a; b; c)$ شعاع ناظمي له.
- 2- لتكن النقاط: $A(1; 2; -3)$ ، $B(-3; 1; 4)$ و $C(2; 6; -1)$.
(أ) بين أن النقاط A ، B و C تعين مستويا.
(ب) تأكد أن المعادلة الديكارتية للمستوي (ABC) هي $2x - y + z + 3 = 0$.
(ج) لتكن النقطة $I(-5; 9; 4)$. أعط تمثيلا وسيطيا للمستقيم \mathcal{D} الذي يشمل النقطة I وعمودي على المستوي (ABC) .
(د) عين إحداثيات النقطة J ، تقاطع \mathcal{D} مع المستوي (ABC) .
(هـ) استنتج المسافة بين النقطة I والمستوي (ABC) .

$$2\sqrt{6} \quad J(-1; 7; 6) \quad (2t-5; -t+9; t+4)$$

تمرين 6 Bac S Polynésie 2008

- الفضاء مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نعتبر النقط: $A(1; 2; 3)$ ، $B(0; 1; 4)$ ، $C(-1; -3; 2)$ ، $D(4; -2; 5)$ والشعاع $\vec{n}(2; -1; 1)$.
- 1- (أ) بين أن النقط A ، B و C ليست على استقامة.
(ب) بين أن \vec{n} شعاع ناظمي للمستوي (ABC) .
(ج) اكتب المعادلة الديكارتية للمستوي (ABC) .
2- نعتبر المستقيم (Δ) الذي تمثيله الوسيطى:

$$\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = -1 + t \\ z = 4 - t \end{cases} \quad t \text{ عدد حقيقي}$$

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير على ما يلي:

- 1- النقطة A تنتمي إلى المستقيم \mathcal{D} .
- 2- النقطة A تنتمي إلى المستوي \mathcal{P} .
- 3- المستقيم \mathcal{D} والمستوي \mathcal{P} يتقاطعان في $I(8; -1; -1)$.
- 4- المستقيم (AB) والمستوي \mathcal{P} متوازيان.
- 5- مجموعة النقط M من الفضاء حيث $MA = MB$ هي \mathcal{P} .
- 6- تقاطع المستوي \mathcal{P} مع سطح الكرة التي مركزها A وتشمل النقطة B هي دائرة.
- 7- المستقيم \mathcal{D} يوازي المحور $(O; \vec{i})$.

خطأ 7	خطأ 5	صحيح 1	صحيح 4	خطأ 2	صحيح 6	صحيح 3
-------	-------	--------	--------	-------	--------	--------

تمرين 9 Bac S Centres étrangers 2008

- الفضاء مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نعتبر النقط: $A(2; 1; -1)$ ، $B(-1; 2; 4)$ ، $C(0; -2; 3)$ ، $D(1; 1; -2)$ والمستوي $\mathcal{P}: x - 2y + z + 1 = 0$.
- أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير على ما يلي:
- 1- النقط A، B و C تعين مستويا.
 - 2- المستقيم (AC) ينتمي إلى المستوي \mathcal{P} .
 - 3- المعادلة الديكارتيّة للمستوي (ABD) هي: $x + 8y - z - 11 = 0$.
 - 4- التمثيل الوسيطى للمستقيم (AC) هو:

$$\begin{cases} x = 2k \\ y = -2 + 3k \\ z = 3 - 4k \end{cases} \quad k \text{ عدد حقيقي}$$

- 5- المستقيمان (AB) و (CD) متعامدان.
- 6- المسافة بين النقطة C والمستوي \mathcal{P} تساوي $4\sqrt{6}$.
- 7- سطح الكرة التي مركزها D ونصف قطرها $\frac{\sqrt{6}}{3}$ مماسية للمستوي \mathcal{P} .
- 8- النقطة $E\left(-\frac{4}{3}; \frac{2}{3}; \frac{5}{3}\right)$ هي المسقط العمودي للنقطة C على المستوي \mathcal{P} .

خطأ 2	خطأ 6	صحيح 4	صحيح 8	خطأ 5	صحيح 1	صحيح 7	صحيح 3
-------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	--------


بين أن النقطة D تنتمي إلى المستقيم (Δ) وأن هذا المستقيم عمودي على المستوي (ABC).

3- لنكن E المسقط العمودي للنقطة D على المستوي (ABC). بين أن النقطة E هي مركز ثقل المثلث ABC.

$$E(0; 0; 3) \quad 2x - y + z - 3 = 0$$

تمرين 7 Bac S Antilles-Guyane 2007

- في الفضاء المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نعتبر النقطتين: $A(3; 0; 6)$ و $I(0; 0; 6)$ ، نسمي (D) المستقيم الذي يشمل النقطتين A و I. نعتبر المستويين التاليين: (P): $2y + z - 6 = 0$ ، (Q): $y - 2z + 12 = 0$.
- 1- بين أن المستويين (P) و (Q) متعامدان.
 - 2- بين أن تقاطع المستويين (P) و (Q) هو المستقيم (D).
 - 3- بين أن المستويين (P) و (Q) يقطعان المحور $(O; \vec{j})$ وحدد إحداثيات النقطتين B و C، تقاطع المستويين (P) و (Q) على الترتيب مع $(O; \vec{j})$.
 - 4- بين أن معادلة المستوي (T) الذي يشمل النقطة B وشعاعه الناظمي \vec{AC} هي $x + 4y + 2z - 12 = 0$.
 - 5- أعط تمثيلا وسيطيا للمستقيم (OA). بين أن المستقيم (OA) والمستوي (T) يتقاطعان في نقطة H يطلب تحديدها.
 - 6- ماذا تمثل النقطة H بالنسبة للمثلث ABC؟ علل.



$$H(2, 4; 0; 4, 8) \quad (3t; 0; 6t) \quad C(0; -12; 0) \quad B(0; 3; 0)$$

تمرين 8

الفضاء مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نعتبر المستقيم \mathcal{D} الذي تمثيله الوسيطى:

$$\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 - t \\ z = 3 - 2t \end{cases} \quad t \text{ عدد حقيقي}$$

- نعتبر النقطتين: $A(2; 1; 3)$ و $B(5; -2; 2)$.
- نعتبر المستوي \mathcal{P} الذي معادلته $x + 3z - 5 = 0$.

الأعداد المركبة

Nombres Complexes

تمرين 5

في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، لاحقة النقطة M هي العدد المركب $z = x + iy$ ، x و y عددين حقيقيين. نرفق بكل عدد مركب $z \neq 2$ العدد المركب Z حيث:

$$Z = \frac{z+2}{z-2}$$

1- اكتب Z على الشكل الجبري.

2- عين المجموعة E_1 للنقط M من المستوي حتى يكون Z عددا حقيقيا، والمجموعة E_2 للنقط M من المستوي حتى يكون Z عددا تخيليا صرفا.

3- لتكن النقطة M' صورة Z . عين المجموعة E_3 للنقط M من المستوي حتى تكون: O, M, M' على استقامة واحدة.

$$(y=0) \cup [r=2\sqrt{2}; \Omega(-2,0)] \quad r=2; O(0,0) \quad y=0$$

تمرين 6

في المستوي المركب لاحقة النقطة M هي العدد المركب: $z = x + iy$ ، x و y عددين حقيقيين. نرفق بكل عدد مركب $z \neq -i$ العدد المركب Z حيث:

$$Z = \frac{z-2-i}{z+i}$$

1- عين $\text{Re}(Z)$ و $\text{Im}(Z)$.

2- عين مجموعة النقط M من المستوي بحيث:

- يكون Z عددا حقيقيا.
- يكون Z عددا تخيليا صرفا.
- تكون: $|Z| = \sqrt{2}$.

$$r=4; \Omega(-2,-3) \quad r=\sqrt{2}; \Omega(1,0) \quad y=x-1$$

تمرين 7

في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، لاحقة النقطة M هي العدد المركب: $z = x + iy$ ، x و y عددين حقيقيين. نرفق بكل عدد مركب $z \neq i$ العدد المركب $f(z)$:

$$f(z) = \frac{2z-i}{iz+1}$$

1- عين وأنشئ المجموعة E للنقط M من المستوي حتى يكون $f(z)$ عددا حقيقيا موجبا. (وحدة الطول 4cm)

2- حل في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة: $f(\bar{z}) = \frac{7}{4}i$.

$$z=3i \quad [r=\frac{1}{4}; \Omega(0, \frac{3}{4})] \cap (x>0)$$

تمرين 1

اكتب على الشكل الجبري الأعداد المركبة التالية:

$$z_1 = (1+2i)^2(3+4i) + (1-i)^3 + 20$$

$$z_2 = \frac{1+18i}{3+4i} + \frac{7-26i}{3-4i} - \frac{-2+15i}{i}$$

$$z_3 = [(-\sqrt{3}-1) + (\sqrt{3}+1)i]^2$$

$$z_5 = \left(\frac{5+7i}{-7+5i}\right)^{2011} \quad z_4 = \frac{-\sqrt{2}+2+\sqrt{2}i}{1+\sqrt{2}i-i}$$

$$i \quad 1+i \quad -4(2+\sqrt{3})i \quad -7-2i \quad -7-2i$$

تمرين 2

حل في مجموعة الأعداد المركبة \mathbb{C} المعادلات التالية:

$$(1) \quad z.\bar{z} + 2z - 3\bar{z} - 31 - 25i = 0$$

$$(2) \quad z^2 + 4\bar{z} - 5 = 0$$

$$(3) \quad (z + \bar{z})^2 + 2iz.\bar{z} - 4i = 0$$

$$\pm\sqrt{2}i \quad 1; -5; 2-\sqrt{7}i; 2+\sqrt{7}i \quad -2+5i; 3+5i$$

تمرين 3

عين مجموعة النقط $M(z)$ من المستوي المركب بحيث:

$$(1) \quad |z-1+i| = |z+1|$$

$$(2) \quad |iz-3-2i| = 3$$

$$(3) \quad z + \bar{z} = |z|$$

$$(y=\sqrt{3}x) \cup (y=-\sqrt{3}x) \quad x \geq 0 \quad r=3; \Omega(2,-3) \quad 4x-2y-1=0$$

تمرين 4

في المستوي المركب، لاحقة النقطة M هي العدد المركب: $z = x + iy$ ، x و y عددين حقيقيين. نرفق بكل عدد مركب z العدد المركب Z حيث:

$$Z = 2z.\bar{z} + iz - (2+i)\bar{z} - 7 + 2i$$

1- اكتب Z على الشكل الجبري.

2- عين وارسم المجموعة E_1 للنقط M من المستوي حتى يكون Z عددا حقيقيا. (وحدة الطول 2cm)

3- عين وارسم المجموعة E_2 للنقط M من المستوي حتى يكون Z عددا تخيليا صرفا.

$$r=2; \Omega(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \quad y=-1$$

تمرين 8

اكتب على الشكل المتلثي الأعداد المركبة التالية:

$$z_4 = 5, \quad z_3 = 3 + i\sqrt{3}, \quad z_2 = -\sqrt{3} + i, \quad z_1 = 2 + 2i$$

$$z_7 = (\sqrt{2} - \sqrt{2}i)^5, \quad z_6 = (1 - \sqrt{3})i, \quad z_5 = -8ie^{i\frac{\pi}{6}}$$

$$z_{10} = \frac{3\sqrt{2}i}{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}}, \quad z_9 = \frac{-1-i}{1+i\sqrt{3}}, \quad z_8 = (1-i\sqrt{3})(1+i)$$

$$z_{13} = \alpha i (\alpha \in \mathbb{R}), \quad z_{12} = \frac{5+i\sqrt{3}}{2-i\sqrt{3}}, \quad z_{11} = \frac{4e^{i\pi}}{\sqrt{6}-i\sqrt{2}}$$

$$z_{15} = -2(\cos\theta + i\sin\theta) (\theta \in \mathbb{R}), \quad z_{14} = \alpha i (\alpha \in \mathbb{C})$$

$$z_{16} = \sin 2\theta + 2i\sin^2\theta \quad (0 < \theta < \pi)$$

$$z_{17} = 1 - \tan^2\theta + 2i\tan\theta \quad (-\pi/2 < \theta < \pi/2)$$

$$z_{18} = \frac{1+i\tan\theta}{1-i\tan\theta} \quad (-\pi/2 < \theta < \pi/2)$$

$z_7 \left[32, -\frac{5\pi}{4} \right]$	$z_6 \left[\sqrt{3}-1, -\frac{\pi}{2} \right]$	$z_5 \left[8, -\frac{\pi}{3} \right]$	$z_2 \left[2, \frac{5\pi}{6} \right]$
$z_{11} \left[\sqrt{2}, \frac{7\pi}{6} \right]$	$z_{10} \left[3, \frac{3\pi}{4} \right]$	$z_9 \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{11\pi}{12} \right]$	$z_8 \left[2\sqrt{2}, -\frac{\pi}{12} \right]$
$z_{18} [1, 2\theta]$	$z_{16} [2\sin\theta, \theta]$	$z_{14} \left[r, \theta + \frac{\pi}{2} \right]$	$z_{12} \left[2, \frac{\pi}{3} \right]$

تمرين 9

اكتب على الشكل الجبري والأسّي الأعداد المركبة التالية:

$$z_2 = -\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}, \quad z_1 = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{6} - i\sin\frac{7\pi}{6}\right)$$

$$z_4 = \frac{(\sqrt{6}e^{i\frac{5\pi}{6}})^2 \cdot e^{i\frac{4\pi}{3}}}{3e^{i\frac{3\pi}{2}}}, \quad z_3 = \left[2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) \right]^4$$

$-2i$	$-8-8\sqrt{3}i$	$1-i$	$-\sqrt{6}+\sqrt{2}i$
$2e^{i\frac{3\pi}{2}}$	$16e^{i\frac{4\pi}{3}}$	$\sqrt{2}e^{i\frac{7\pi}{4}}$	$2\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{6}}$

تمرين 10

ليكن Z عدد مركب معرف كما يلي:

$$Z = \frac{(\sqrt{2}-1) + i(\sqrt{2}+1)}{\sqrt{2}+i}$$

1- اكتب Z على الشكل الجبري ثم على الشكل المتلثي.

2- عين الأعداد الصحيحة n حتى يكون Z^n عددا حقيقيا.

3- عين الأعداد الصحيحة n حتى يكون Z^n تخيليا صرفا.

4- اكتب على الشكل الأسّي ثم على الشكل الجبري العدد

$$Z \times z = 4\sqrt{2}e^{i\frac{13\pi}{12}} \quad \text{حيث:}$$

$-2\sqrt{3}+2i$	$4e^{i\frac{5\pi}{6}}$	$4k+2$	$4k$	$\left[\sqrt{2}, \frac{\pi}{4} \right]$	$1+i$
-----------------	------------------------	--------	------	--	-------

تمرين 11

z_3, z_2, z_1 ثلاثة أعداد مركبة معرفة بما يلي:

$$z_3 = \frac{z_1}{z_2}, \quad z_2 = 1 - i\sqrt{3}, \quad z_1 = 1 + i$$

1- عين طويلة وعمدة كل من z_1 و z_2 .

2- اكتب z_3 على الشكل الجبري وعلى الشكل المتلثي.

3- استنتج قيمتي: $\cos\frac{7\pi}{12}$ و $\sin\frac{7\pi}{12}$.

$$4- \text{بين أن: } n \in \mathbb{N} \cdot \left(\frac{z_1}{\sqrt{2}} \right)^n + \left(\frac{\bar{z}_1}{\sqrt{2}} \right)^n = 2\cos\frac{n\pi}{4}$$

$\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{7\pi}{12} \right]$	$\frac{1-\sqrt{3}}{4} + i\frac{1+\sqrt{3}}{4}$	$\left[2, -\frac{\pi}{3} \right]$	$\left[\sqrt{2}, \frac{\pi}{4} \right]$
--	--	------------------------------------	--

تمرين 12

Z, z_2, z_1 ثلاثة أعداد مركبة معرفة بما يلي:

$$Z = \frac{z_1^5}{z_2^4}, \quad z_2 = \sqrt{2} - i\sqrt{6}, \quad z_1 = 1 - i$$

1- عين طويلة وعمدة كل من z_1, z_2, z_1^5 و z_2^4 .

- استنتج الشكل الجبري لكل من z_1^5 و z_2^4 .

2- عين الجزء الحقيقي والجزء التخيلي للعدد المركب Z .

3- احسب طويلة وعمدة العدد Z ثم استنتج قيمة: $\tan\frac{\pi}{12}$.

4- عين الأعداد الصحيحة n حتى يكون Z^n عددا حقيقيا موجبا.

$\left[64, -\frac{4\pi}{3} \right]$	$\left[4\sqrt{2}, -\frac{5\pi}{4} \right]$	$\left[2\sqrt{2}, -\frac{\pi}{3} \right]$	$\left[\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4} \right]$
$24k$	$2-\sqrt{3}$	$\left[\frac{\sqrt{2}}{16}, \frac{\pi}{12} \right]$	$\frac{-4+4i}{-32+32\sqrt{3}i} = \frac{\sqrt{3}+1}{32} + i\frac{\sqrt{3}-1}{32}$

تمرين 13

z_3, z_2, z_1 ثلاثة أعداد مركبة معرفة بما يلي:

$$z_3 = \frac{z_1}{z_2}, \quad z_2 = -1 + i\sqrt{3}, \quad z_1 = (1 + \sqrt{3}) + i(1 - \sqrt{3})$$

1- عين طويلة وعمدة كل من z_2 و z_3 ثم z_1 .

2- استنتج قيمتي: $\cos\frac{\pi}{12}$ و $\sin\frac{\pi}{12}$.

3- احسب العددين: $\left(\frac{z_1 + z_2}{\sqrt{2}z_3} \right)^{1432}$ و $\left(\frac{z_3}{\sqrt{2}} \right)^{2012}$.

4- اكتب على الشكل الأسّي الجذور التكعيبية للعدد: $2z_3$

$-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$	-1	$\left[2\sqrt{2}, -\frac{\pi}{12} \right]$	$\left[\sqrt{2}, \frac{5\pi}{4} \right]$	$\left[2, \frac{2\pi}{3} \right]$
$\sqrt{2}e^{i\frac{7\pi}{4}}$	$\sqrt{2}e^{i\frac{13\pi}{12}}$	$\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{12}}$		

تمرين 14

نعتبر المعادلة (E) في مجموعة الأعداد المركبة \mathbb{C} :

$$z^3 - 4(1+i)z^2 + 12iz + 8 - 8i = 0$$

- 1- برهن أن المعادلة (E) تقبل حلا حقيقيا z_0 يطلب حسابه.
- 2- عين العددين المركبين a و b بحيث يمكن كتابة المعادلة (E) على شكل: $(z-2)(z-2i)(az+b)=0$.
- 3- استنتج حلول المعادلة (E).
- 4- المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. لتكن A, B و C النقاط التي لواحقها على الترتيب: $z_A = 2, z_B = 2i, z_C = 2 + 2i$. عين طبيعة المثلث ABC واحسب إحداثيتي مركز ثقله.

$(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$	$2+2i$	$2i$	2
------------------------------	--------	------	-----

تمرين 15

نعتبر المعادلة (E) في مجموعة الأعداد المركبة \mathbb{C} :

$$z^3 + 2(1+i)z^2 + (9+4i)z + 18i = 0$$

- 1- برهن أن (E) تقبل حلا تخيليا صرفا z_0 يطلب حسابه، ثم عين الأعداد الحقيقية a, b و c بحيث يمكن كتابة (E) على شكل: $(z-z_0)(az^2+bz+c)=0$.
- 2- استنتج الحلين الآخرين: z_1 و z_2 حيث $\text{Im}(z_1) < 0$.
- 3- المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. لتكن A و B صورتا العددين المركبين z_1 و z_2 على الترتيب. عين طبيعة المثلث OAB.

$-1+2\sqrt{2}i$	$-1-2\sqrt{2}i$	$-2i$
-----------------	-----------------	-------

تمرين 16

$f(z)$ كثير الحدود للمتغير المركب z حيث:

$$f(z) = z^3 - 3\sqrt{2}z^2 + 6z - 18\sqrt{2}$$

- 1- احسب $f(3\sqrt{2})$ ثم عين العدد الحقيقي a بحيث: $f(z) = (z-3\sqrt{2})(z^2+a)$.
- 2- حل في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة $f(z) = 0$. نرسم إلى z_1, z_2 و z_3 حلول المعادلة $f(z) = 0$ حيث $\text{Im}(z_2) < 0$.
- 3- المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. لتكن النقاط A, B و C صور الأعداد المركبة z_1, z_2 و z_3 حلول المعادلة $f(z) = 0$ على الترتيب. عين طبيعة المثلثين ABC و OAB.

$\sqrt{6}i$	$-\sqrt{6}i$	$3\sqrt{2}$	$a=6$
-------------	--------------	-------------	-------

تمرين 17

1- حل في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة (E) التالية:

$$(iz + 3 + 4i)(z^2 - 8z + 25) = 0$$

- نرمز لحلول المعادلة (E) بـ z_0, z_1 و z_2 حيث:
- 2- المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. لتكن A, B و C نقاط من هذا المستوي لواحقها z_0, z_1 و z_2 على الترتيب. بين أن النقاط A, B و C تنتمي إلى نفس الدائرة (\mathcal{C}) ، يطلب تعيين مركزها ω ونصف قطرها r . أنشئ المثلث ABC والدائرة (\mathcal{C}) .

$r=5; \omega(0,0)$	$4-3i$	$4+3i$	$-4+3i$
--------------------	--------	--------	---------

تمرين 18

1- حل في مجموعة الأعداد المركبة \mathbb{C} المعادلة التالية:

$$z^2 - 2mz + m^2 + 1 = 0$$

z مجهول و m وسيط حقيقي.

- 2- المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. لتكن M_1 و M_2 نقطتان لاحقتاهما على الترتيب العددين المركبين: $z_1 = m - i$ و $z_2 = m + i$.
- عين قيم الوسيط الحقيقي m حتى يكون المثلث OM_1M_2 متساوي الأضلاع.
- عين قيم m حتى تكون O, M_1 و M_2 في استقامية.

0	$\pm\sqrt{3}$	$m+i$	$m-i$
-----	---------------	-------	-------

تمرين 19

$f(z)$ كثير الحدود للمتغير المركب z حيث:

$$f(z) = z^4 + (2-i)z^3 + z^2 + (12-i)z + 20 - 10i$$

- 1- بين أن المعادلة $f(z) = 0$ تقبل حلا حقيقيا $z_0 = -2$.
- 2- عين كثير الحدود $(g(z) = z^3 + az^2 + bz + c)$ حيث: $f(z) = (z - z_0) \times g(z)$ (a, b و c أعدادا مركبة).
- 3- اكتب $\overline{g(z)}$ بدلالة \overline{z} ، حيث \overline{z} مرافق z ، ثم حل في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة $\overline{g(z)} = 0$ إذا علمت أنها تقبل حلين مترافقين z_1 و $\overline{z_1}$. الحل z_1 يحقق $\text{Im}(z_1) < 0$.
- 4- المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. لتكن النقاط M_0, M_1, M_2, M_3 صور الأعداد المركبة z_0, z_1, z_2 و z_3 حلول $f(z) = 0$ على الترتيب. أنشئ الرباعي $M_0M_1M_2M_3$ واحسب مساحته.

$7,5 u.a$	$-2+i$	$1+2i$	$1-2i$	-2
-----------	--------	--------	--------	------

تمرين 20

في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. (الوحدة 1cm)

1- أنشئ النقط A, B و C ذات اللواحق على الترتيب:
 $z_C = 3 + 2i$ ، $z_B = 2 - i$ ، $z_A = 1 + i$

2- احسب لاحقتي الشعاعين: \overrightarrow{AB} و \overrightarrow{AC} .

3- فسر هندسيا الطويلة والعمدة للعدد المركب: $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

- بين أن: $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = e^{i\frac{\pi}{2}}$ واستنتج طبيعة المثلث ABC.

4- عين لاحقة النقطة I مركز الدائرة (Γ) المحيطة بالمثلث ABC ثم احسب نصف قطرها r . ارسم (Γ).

5- عين لاحقة النقطة D حتى يكون ABDC مربعا.

$z_D = 4$	$r = \frac{\sqrt{10}}{2}$	$z_I = \frac{5}{2} + \frac{1}{2}i$
-----------	---------------------------	------------------------------------

تمرين 21

في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. لتكن النقط A, B و C التي لواحقها على الترتيب:

$z_C = -2i$ ، $z_B = 2\sqrt{3} - 2i$ ، $z_A = \sqrt{3} + i$

1- اكتب على الشكل الأسّي العدد المركب: $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$ ثم استنتج طبيعة المثلث ABC واحسب مركز ثقله G.

2- لتكن النقطة D نظيرة A بالنسبة لحامل محور الترتيب.
 • عين لاحقة النقطة D.
 • مثل الرباعي ABCD ثم عين بدقة طبيعته. الوحدة 1cm

3- اكتب على الشكل الأسّي العدد المركب: $\frac{2\sqrt{3} - 2i}{-\sqrt{3} + i}$.

- بين أن $\arg\left(\frac{2\sqrt{3} - 2i}{-\sqrt{3} + i}\right) = (\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OB})$ ثم استنتج أن النقط B, O و D على استقامة واحدة.

$2e^{i\pi}$	$z_D = -\sqrt{3} + i$	$G(\sqrt{3}, -1)$	$e^{i\frac{\pi}{3}}$
-------------	-----------------------	-------------------	----------------------

تمرين 22 (بكالوريا)

في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، الوحدة 1cm. لتكن النقط A, B و C لواحقها على الترتيب:

$z_C = 2i$ ، $z_B = 2\sqrt{3}$ ، $z_A = \sqrt{3} + 3i$

1- مثل النقط A, B و C على ورقة مليمتريّة.

2- عين الطويلة وعمدة للعدد المركب z_A .

3- (أ) احسب طويلة كل من الأعداد المركبة التالية:

$z_A - z_C$ ، $z_B - z_A$ و $z_B - z_C$. استنتج طبيعة المثلث ABC.

(ب) عين لاحقة المركز K للدائرة (Γ) المحيطة بالمثلث ABC ، حدد نصف قطر هذه الدائرة.

(ج) بين أن النقطة O تنتمي إلى الدائرة (Γ).

4- لتكن النقطة D ذات الاحقة $z_D = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$.

(أ) بين أن $z_D = \sqrt{3} - i$.

(ب) احسب لاحقة المنتصف M للقطعة [AD].

(ج) بين أن الرباعي ABDC مستطيل.

$z_M = \sqrt{3} + i$	$z_K = \sqrt{3} + i$	$2\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{3}}$
----------------------	----------------------	-------------------------------

تمرين 23

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

1- نعتبر النقطتين A و B لاحقتيهما على الترتيب:

$z_B = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$ و $z_A = -\sqrt{2} + 3\sqrt{2}i$

(أ) عين الاحقة z_C للنقطة C نظيرة B بالنسبة للمبدأ O.

(ب) عين الاحقة z_I للنقطة I منتصف القطعة [AC].

(ج) عين الاحقة z_D للنقطة D نظيرة B بالنسبة للنقطة I.

(د) أنشئ النقط A, B, C, D و I. (الوحدة 1cm)

2- (أ) فسر هندسيا الطويلة والعمدة للعدد المركب: $\frac{z_A - z_C}{z_D - z_B}$.

(ب) تحقق أن العدد المركب $\frac{z_A - z_C}{z_D - z_B} = e^{-i\frac{\pi}{2}}$.

(ج) ماذا يمكن قوله عن القطعتين [AC] و [BD]؟

3- ماهي طبيعة الرباعي ABCD؟ احسب مساحته.

4- بين أن النقط A, B, C و D تنتمي إلى نفس الدائرة

(C) يطلب حساب لاحقة مركزها ω ونصف قطرها r.

5- لتكن النقطة E نظيرة B بالنسبة لحامل محور الفواصل.

(أ) عين لاحقة النقطة E.

(ب) احسب الجداء: $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BE}$.

(ج) ماذا يمثل المستقيم (BE) بالنسبة للدائرة (C)؟

$z_E = \sqrt{2} - \sqrt{2}i$	$z_D = -3\sqrt{2} + \sqrt{2}i$	$z_I = -\sqrt{2} + \sqrt{2}i$	$z_C = -\sqrt{2} - \sqrt{2}i$
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

تمرين 24

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، (وحدة الرسم 2cm). عين هندسيا ثم أنشئ مجموعة النقط M من المستوي لاحقتها z في كل حالة من الحالات التالية:

$$|z - 2 - 3i| = 1 \quad (1)$$

$$|z + 1| = |z - 1 + 2i| \quad (2)$$

$$|(1 + i)\bar{z}| = 3\sqrt{2} \quad (3)$$

التحويلات النقطية

Transformations ponctuellesتمرين 1

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.
لتكن النقطتان A و B لاحتقاهما على الترتيب العددين المركبين: $z_A = 1$ و $z_B = 2 + 2i$.

1- عيّن z_C لاحقة النقطة C ، صورة النقطة B بالانسحاب t الذي شعاعه $\vec{U} \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \end{pmatrix}$.

2- عيّن z_D لاحقة النقطة D ، صورة النقطة C بالتحاكي h الذي مركزه النقطة A ونسبته 3-.

3- عيّن z_E لاحقة النقطة E صورة النقطة C بالدوران r الذي مركزه المبدأ O وزاويته $-\frac{\pi}{2}$.

4- أنشئ النقط: A ، B ، C ، D و E. وحدة الرسم 1cm.

5- احسب $\frac{z_E - z_B}{z_D - z_B}$ ثم استنتج طبيعة المثلث BDE.

i	$-2-2i$	$-2+6i$	$2-2i$
-----	---------	---------	--------

تمرين 2

نعتبر التحويل النقطي T من المستوي الذي يرفق بالنقطة M لاحتقتها z النقطة M' لاحتقتها z' حيث: $z' = iz + 3 - i$.

1- عيّن طبيعة التحويل T وعناصره المميزة.

2- عيّن A' و B' صورتي النقطتين $A(1;3)$ و $B(-1;1)$ على الترتيب بالتحويل T . استعمل المدور لإنشاء A' و B' .

3- ليكن (Δ) مستقيم معادلته: $y = x + 2$. اكتب معادلة المستقيم (Δ') صورة المستقيم (Δ) بواسطة التحويل T .

4- عيّن (\mathcal{C}') صورة الدائرة (\mathcal{C}) التي قطرها $[AB]$ ، بواسطة التحويل T . أنشئ (Δ) ، (Δ') ، (\mathcal{C}) و (\mathcal{C}') .

$R = \sqrt{2}; \omega(1;-1)$	$y' = -x'$	$\frac{\pi}{2}; \Omega(2;1)$
------------------------------	------------	------------------------------

تمرين 3

المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. لتكن A ، B و C النقط التي لواحقتها على الترتيب 2- ، $2i$ و $1+3i$.

1- نعتبر التحويل T الذي مركزه B ويحول النقطة A إلى النقطة C. عيّن العبارة المركبة لهذا التحويل وعناصره المميزة ثم بيّن أن النقط: A ، B و C على استقامة واحدة.

2- عيّن مركز وزاوية الدوران r حيث: $r(O)=B$ و $r(A)=O$.

$\frac{\pi}{2}; \Omega(-1; 1)$	$z' = -\frac{1}{2}z + 3i$
--------------------------------	---------------------------

تمرين 4 (بكالوريا بتصرف)

المستوي (P) منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

1- حل في \mathbb{C} المعادلة (E): $z^3 - 8 = 0$.

2- نعتبر في المستوي (P) النقط A ، B و C لواحقتها على الترتيب: $z_A = -1 + i\sqrt{3}$ ، $z_B = 2$ ، $z_C = -1 - i\sqrt{3}$. اكتب z_A و z_C على الشكل المثلثي. عيّن طبيعة ABC.

3- نعتبر التطبيق f من المستوي الذي يرفق بالنقطة M ذات اللاحقة z النقطة M' ذات اللاحقة z' حيث: $z' = e^{2i\frac{\pi}{3}}z$.

(أ) عيّن الطبيعة الهندسية للتطبيق f .
(ب) عيّن صورتي النقطتين A و C بـ f .
استنتج صورة المستقيم (AC) بـ f .

$$f(C)=B \text{ و } f(A)=C$$

تمرين 5 Bac S Antilles-Guyane 2010

المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ حيث الوحدة 1cm.

1- من أجل $M \neq \Omega$ ، نذكر أن النقطة M' هي صورة النقطة M بالدوران r الذي مركزه Ω وزاويته θ إذا وفقط

$$\begin{cases} \Omega M' = \Omega M & (1) \\ (\overline{\Omega M}; \overline{\Omega M'}) = \theta [2\pi] & (2) \end{cases} \quad \text{إذا:}$$

(أ) لتكن z ، z' و ω لواحق النقط M ، M' و Ω على الترتيب. ترجم (1) و (2) بعبارتي الطويلة والعمدة.

(ب) استنتج عبارة z' بدلالة z ، θ و ω .

2- حل في مجموعة الأعداد المركبة \mathbb{C} المعادلة التالية:

$$z^2 - 4\sqrt{3}z + 16 = 0$$

3- لتكن النقطتان A و B لاحتقاهما على الترتيب $a = 2\sqrt{3} - 2i$ و $b = 2\sqrt{3} + 2i$.

(أ) اكتب a و b على الشكل الأسّي.

(ب) مثلّ النقطتين A و B.

(ج) بيّن أن OAB مثلث متساوي الأضلاع.

4- لتكن C نقطة لاحتقتها $c = -8i$ و D صورتها بالدوران

الذي مركزه O وزاويته $\frac{2\pi}{3}$. مثلّ النقطتين C و D.

بيّن أن لاحقة النقطة D هي $d = 4\sqrt{3} + 4i$.

5- بيّن أن D هي صورة النقطة B بالتحاكي الذي مركزه O ويطلب تحديد نسبته.

6- بيّن أن OAD مثلث قائم.

الترتيب: $z_A = 3 - i$ و $z_B = 4 - 3i$. نعتبر التطبيق f من هذا المستوى الذي يرفق بكل نقطة M تختلف عن A لاحقتها z النقطة M' لاحقتها z' حيث: $z' = \frac{z-4+3i}{z-3+i}$.

1- حل في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة: $z' = z - i$.

2- أعط تفسيرا هندسيا لطويلة العدد المركب z' ، ثم عين وأنشئ المجموعة (E_1) للنقط M بحيث: $|z'| = 1$.

3- (أ) أعط تفسيرا هندسيا لعمدة العدد المركب z' .

(ب) عين وأنشئ المجموعة (E_2) للنقط M حتى يكون z' حقيقيا

ثم المجموعة (E_3) للنقط M حتى يكون z' تخيليا صرفا.

$2 - i$; $2 + i$	محور $[AB]$	المستقيم (AB)	دائرة قطرها $[AB]$
-------------------	-------------	-----------------	--------------------

تمرين 9

في كل سؤال، اختر جوابا واحدا صحيحا. (برّر إجابتك)

1- النقطة M التي تنتمي إلى دائرة مركزها $A(0;-1)$ ونصف قطرها $r = 3$ لاحقتها z تحقق:

(أ) $|z + i|^2 = 3$ (ب) $|z + i| = 3$ (ج) $|z - i| = 3$

2- في المستوى المركب، لتكن النقطتان A و B لاحقتاهما على الترتيب: $z_A = 2$ و $z_B = 3 - 2i$. لتكن (E) مجموعة النقط M بحيث: $|z - 2| = |z - 3 + 2i|$.

(أ) (E) هي محور القطعة $[AB]$. (ب) (E) هي القطعة $[AB]$.

(ج) (E) هي دائرة مركزها A و قطرها $[AB]$.

3- ليكن العدد المركب: $z = \sqrt{2 - \sqrt{3}} - i\sqrt{2 + \sqrt{3}}$.

(أ) الشكل الأسّي للعدد المركب z^2 هو: $z^2 = 4e^{i\frac{\pi}{6}}$ (ب) $z^2 = 4e^{-i\frac{\pi}{6}}$ (ج) $z^2 = 4e^{i\frac{7\pi}{6}}$

(أ) الشكل الأسّي للعدد المركب z هو: $z = 2e^{i\frac{\pi}{12}}$ (ب) $z = 2e^{i\frac{7\pi}{12}}$ (ج) $z = 2e^{i\frac{19\pi}{12}}$

4- لتكن النقط A ، B و C بحيث: $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B} = e^{i\frac{\pi}{2}}$.

(أ) ABC مثلث متساوي الأضلاع. (ب) ABC مثلث متساوي الساقين وقائم. (ج) A ، B و C على اسقامة واحدة.

5- في المستوى المركب، لتكن النقط A ، B و C لواحقها على الترتيب: $z_A = 2i$ ، $z_B = 1$ ، $z_C = 4 - i$. العبارة المركبة للتشابه المباشر s بحيث: $s(A) = B$ و $s(B) = C$ هي:

(أ) $z' = (1 + i)z + 3 - 2i$ (ب) $z' = (1 - i)z + 3 - 2i$

(ج) $z' = (1 + i)z - 3 + 2i$

4 ب	3 أ ج	2 إ	5 إ	1 ب	3 ب ج
-----	-------	-----	-----	-----	-------

﴿ عبد المطلب ﴾

تمرين 6 Bac S Amérique du Nord 2007

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ (وحدة الرسم 4cm). لتكن النقطة A ذات اللاحقة $z_A = i$ و B النقطة ذات اللاحقة $z_B = e^{-i\frac{5\pi}{6}}$.

1- ليكن r الدوران الذي مركزه O وزاويته $\frac{2\pi}{3}$. نسمي C صورة B بواسطة التحويل r . (أ) اكتب العبارة المركبة للتحويل r . (ب) بين أن لاحقة C هي $z_C = e^{-i\frac{\pi}{6}}$.

(ج) اكتب z_B و z_C على الشكل الجبري.

(د) أنشئ النقط A ، B و C .

2- لتكن D مرجح النقط A ، B و C المرفقة بالمعاملات 2، -1، و 2 على الترتيب.

(أ) بين أن لاحقة D هي $z_D = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$. أنشئ النقطة D .

(ب) بين أن A ، B ، C و D تنتمي إلى نفس الدائرة.

3- ليكن h التحاكي الذي مركزه A ونسبته 2. نسمي E صورة D بواسطة التحويل h . (أ) اكتب العبارة المركبة للتحويل h . (ب) بين أن لاحقة E هي $z_E = \sqrt{3}$. أنشئ E .

4- (أ) احسب النسبة $\frac{z_D - z_C}{z_E - z_C}$. اكتب النتيجة بالشكل الأسّي.

(ب) استنتج طبيعة المثلث CDE .

تمرين 7

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ (وحدة الرسم 2cm). لتكن النقطتان A و B لاحقتاهما على الترتيب: $z_A = 2 + 2i$ و $z_B = -1 + 3i$. ليكن h التحاكي الذي مركزه النقطة A ونسبته -3، و ليكن r الدوران الذي مركزه النقطة B وزاويته $-\frac{\pi}{2}$. نضع $s = roh$.

1- عين طبيعة التحويل s وعناصره المميزة.

2- بين أن صورة A بـ r هي C ذات اللاحقة $z_C = -2$.

3- لتكن G مرجح الجملة: $\{(A, 1); (B, -2); (C, 3)\}$.

• عين وأنشئ المجموعتين (E_1) و (E_2) للنقط M بحيث:

(E_1) $\|\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}\| = 2\sqrt{5}$

(E_2) $\|\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}\| = 2\|\overrightarrow{MA}\|$

• بين أن المجموعة (E_1) تشمل النقطتين O و C .

$z' = 3iz + 4 - 6i$	دائرة $(-1; -2)$ ، $r = \sqrt{5}$	محور $[AG]$
---------------------	-----------------------------------	-------------

تمرين 8

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ (وحدة الرسم 1cm). لتكن النقطتان A و B لاحقتاهما على

الاستدلال بالتراجع

Raisonnement par récurrence

تمرين 1

برهن بالتراجع أنه:

$$1- \text{ من أجل كل عدد طبيعي } n \text{ فإن: } 2 + 5 + 8 + \dots + 3n + 2 = \frac{(n+1)(3n+4)}{2}$$

$$2- \text{ من أجل كل عدد طبيعي } n \text{ فإن: } 1 \times 2^2 + 2 \times 4^2 + 3 \times 6^2 + \dots + n(2n)^2 = [n(n+1)]^2$$

$$3- \text{ من أجل كل عدد طبيعي } n > 0 \text{ فإن: } 1 \times 2^0 + 4 \times 2^1 + 7 \times 2^2 + \dots + (3n-2)2^{n-1} = 5 + (3n-5)2^n$$

$$4- \text{ من أجل كل عدد طبيعي } n \text{ فإن: } 1 + \alpha^1 + \alpha^2 + \dots + \alpha^n = \frac{\alpha^{n+1} - 1}{\alpha - 1} \quad (\alpha \neq 1)$$

$$5- \text{ من أجل كل عدد طبيعي } n \text{ فإن: } 7^n - 1 \text{ مضاعف للعدد } 6.$$

$$6- \text{ من أجل كل عدد طبيعي } n > 0 \text{ فإن: } 5^{4n} - 3^{3n} \text{ مضاعف للعدد } 13.$$

$$7- \text{ من أجل كل عدد طبيعي } n > 1 \text{ فإن: } 4^n > 3n + 1.$$

$$8- \text{ من أجل كل عدد طبيعي } n \geq 1 \text{ فإن: } 2^n \leq 2n! \text{ نذكر أن: } n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$$

تمرين 2

نعتبر الدالة f المعرفة على \mathbb{R} بـ: $f(x) = (x+1)e^x$.

$$1- \text{ عين } f', f'', f^{(3)}, f^{(4)} \text{ الدوال المشتقة المتتالية للدالة } f.$$

$$2- \text{ أعط تخميناً للمشتق النوني للدالة } f \text{ وليكن } f^{(n)}(x) \text{ حيث } n \text{ عدد طبيعي غير معدوم.}$$

$$3- \text{ برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي } n \geq 1 \text{ فإن: } f^{(n)}(x) = (x+n+1)e^x.$$

تمرين 3

$$\text{نعتبر الدالة } f \text{ المعرفة على } \mathbb{R}^* \text{ بـ: } f(x) = \frac{1}{x^2}.$$

$$1- \text{ عين } f', f'', f^{(3)}, f^{(4)} \text{ الدوال المشتقة المتتالية للدالة } f.$$

$$2- \text{ أعط تخميناً للمشتق النوني للدالة } f \text{ وليكن } f^{(n)}(x) \text{ حيث } n \text{ عدد طبيعي غير معدوم.}$$

$$3- \text{ برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي } n \geq 1 \text{ فإن: } f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n \cdot (n+1)!}{x^{n+2}}.$$

المتتاليات العددية

Suites numériques

بوزريعة: ربيع الأول 1432 هـ

تمرين 6

عين الحدود الثلاثة الأولى v_1, v_2, v_3 لمتتالية هندسية حدودها موجبة والمعرفة كما يلي:

$$\begin{cases} v_1 \times v_2 \times v_3 = 1 \\ v_1 + v_2 - 6v_3 = 0 \end{cases}$$

$0,5, 1, 2$

تمرين 7

(v_n) متتالية هندسية حيث:

$$\begin{cases} v_1 \times v_5 = 16 \\ v_2 + v_3 + v_4 = 6 \end{cases}$$

أثبت أن $v_1 \times v_5 = v_3^2$ ثم احسب v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 .

$-1, 2, -4, 8, -16$ $-16, 8, -4, 2, -1$

تمرين 8

عين الحدود v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 لمتتالية هندسية متناقصة تماما حيث:

$$\begin{cases} v_1 + v_2 + v_3 = 140 \\ v_3 + v_4 + v_5 = 35 \end{cases}$$

$5, 10, 20, 40, 80$

تمرين 9

(v_n) متتالية هندسية حيث: $v_3 = 3$ و $v_6 = \frac{81}{8}$.

1- عين الأساس q لهذه المتتالية وحدها الأول v_1 .

2- اكتب عبارة الحد العام v_n بدلالة n .

3- احسب المجموع: $S_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n$.

$\frac{8}{3} [(\frac{3}{2})^n - 1]$ $\frac{4}{3} (\frac{3}{2})^{n-1}$ $\frac{4}{3}$ $\frac{3}{2}$

تمرين 10

(u_n) متتالية عددية معرفة كما يلي: من أجل كل $n \in \mathbb{N}$

$$u_n = \frac{\alpha^2 + n - 1}{\alpha + 1} : \alpha \in \mathbb{R} - \{-1\} \text{ و}$$

1- بين أن (u_n) متتالية حسابية. احسب أساسها r و u_0 .

2- نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1}$.

$$\text{بين أن: } S_n = \frac{n(n + 2\alpha^2 - 3)}{2(\alpha + 1)}$$

3- نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = e^{u_n}$.

بين أن (v_n) متتالية هندسية. احسب أساسها q و v_0 .

4- نضع: $P_n = v_0 \times v_1 \times \dots \times v_{n-1}$. بين أن: $P_n = e^{S_n}$.

$v_0 = e^{\alpha-1}$ $q = e^{\frac{1}{\alpha+1}}$ $u_0 = \alpha - 1$ $r = \frac{1}{\alpha+1}$

المتتالية الحسابية والمتتالية الهندسية

تمرين 1

عين الحدود الثلاثة الأولى u_0, u_1, u_2 لمتتالية حسابية والمعرفة كما يلي:

$$\begin{cases} u_0 + u_1 + u_2 = 3 \\ u_0 \times u_1 \times u_2 = -24 \end{cases}$$

$-4, 1, 6$ $6, 1, -4$

تمرين 2

لتكن a, b, c حدود متتابعة من متتالية حسابية متزايدة تماما بحيث تحقق:

$$\begin{cases} 2a + 3b + c = 7 \\ a^2 + b^2 + c^2 = 62 \end{cases}$$

عين الأساس r لهذه المتتالية ثم استنتج الحدود a, b, c .

$7, 2, -3$ 5

تمرين 3

(u_n) متتالية حسابية حدها الأول $u_1 = 3$ وبمجموع حدودها الأربعة الأولى: $u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = -18$.

1- عين أساس هذه المتتالية وحدها العاشر.

2- اكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n .

3- احسب المجموع: $S = u_1 + u_2 + \dots + u_{10}$.

-195 $8 - 5n$ -42 -5

تمرين 4

(u_n) متتالية حسابية حيث: $u_3 = 2$ و $u_5 = 8$.

1- عين الأساس r لهذه المتتالية وحدها الأول u_1 .

2- احسب المجموع: $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$ ثم عين العدد الطبيعي n بحيث يكون $S_n = 95$.

10 $\frac{n(3n-11)}{2}$ -4 3

تمرين 5

(u_n) متتالية حسابية أساسها $r = -5$ حيث:

$$u_3^2 + u_5^2 + u_7^2 = 875$$

1- احسب الحد u_5 علما أنه موجب ثم احسب u_0 .

2- احسب المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ ثم عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون $8S_n \geq 945$.

$3 \leq n \leq 12$ $\frac{(n+1)(-5n+80)}{2}$ 40 15

البرهان بالتراجع، تغيرات متتالية وتقاربها

تمرين 11

(u_n) متتالية عددية معرفة بحددها الأول $u_0 = 4$ ومن أجل

$$\text{كل عدد طبيعي } n, \quad u_{n+1} = \sqrt{u_n + 20}$$

- 1- برهن أنه من أجل كل $n \geq 0$ فإن $4 \leq u_n < 5$.
- 2- بين أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما.
- 3- استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة. احسب نهايتها.

تمرين 12

(u_n) متتالية عددية معرفة بحددها الأول $u_0 = -1$ ومن أجل

$$\text{كل عدد طبيعي } n, \quad u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{2}$$

- 1- برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $u_n < 3$.
- 2- ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n).
- 3- استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة. احسب نهايتها.
- 4- بين أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ فإن: $u_n = 3 - 2^{-n+2}$.

تمرين 13

(u_n) متتالية عددية معرفة بحددها الأول $u_0 = 2$ ومن أجل

$$\text{كل عدد طبيعي } n, \quad u_{n+1} = \frac{3u_n - 2}{2u_n - 1}$$

- 1- برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $u_n > 1$.
- 2- بين أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما.
- 3- استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة. احسب نهايتها.
- 4- بين أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ فإن: $u_n = \frac{2n+2}{2n+1}$.

تمرين 14

(u_n) متتالية معرفة بـ: $u_1 = \frac{5}{8}$ و $u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 1}{2}$

- 1- برهن أنه من أجل كل $n \geq 1$ فإن $0 < u_n < 1$.
- 2- بين أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما.
- 3- استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة. احسب نهايتها.

تمرين 15

(u_n) متتالية عددية معرفة بحددها الأول $u_0 = 1$ ومن أجل

$$\text{كل عدد طبيعي } n, \quad u_{n+1} = \frac{u_n}{u_n + 1}$$

- 1- احسب u_1, u_2, u_3 ثم أعط تخمينا لعبارة u_n بدلالة n .
- 2- برهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ فإن $u_n = \frac{1}{n+1}$.
- 3- ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) واحسب نهايتها.

تمرين 16 Bac S France 2004

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل

$$\text{عدد طبيعي } n, \quad u_{n+1} = u_n + 2n + 3$$

- 1- ادرس رتبة المتتالية (u_n).
- 2- برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $u_n > n^2$.
- ما هي نهاية المتتالية (u_n) ؟
- 3- أعط تخمينا لعبارة u_n بدلالة n , ثم برهن تخمينك.

تمرين 17 Bac S La Réunion 2007

a عدد حقيقي حيث $-1 < a \leq 0$. نعتبر المتتالية u المعرفة

$$\text{بـ } u_0 = a, \text{ ومن أجل كل عدد طبيعي } n, \quad u_{n+1} = u_n^2 + u_n$$

- 1- ادرس اتجاه تغير المتتالية u .
- 2- (أ) لتكن h الدالة المعرفة على \mathbb{R} بـ $h(x) = x^2 + x$. ادرس اتجاه تغير الدالة h . استنتج أنه من أجل كل x من المجال $]-1; 0[$, $h(x)$ ينتمي كذلك إلى المجال $]-1; 0[$.
- (ب) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $-1 < u_n < 0$.
- 3- ادرس تقارب المتتالية u . احسب نهايتها.

تمرين 18

(u_n) $_{n \in \mathbb{N}^*}$ متتالية معرفة بـ: $u_n = \ln(n+1) - \ln n$

- 1- برهن أنه من أجل كل $n \geq 1$ فإن $0 < u_n \leq \ln 2$.
- 2- بين أن (u_n) $_{n \in \mathbb{N}^*}$ متناقصة تماما. يمكن دراسة اتجاه تغير الدالة $f(x) = \ln(x+1) - \ln x$ على $[1; +\infty[$.
- 3- بين أن المتتالية (u_n) $_{n \in \mathbb{N}^*}$ متقاربة ثم احسب نهايتها.

تمرين 19

من أجل كل $n \in \mathbb{N}^*$ نعتبر: $u_n = n^2 - 2n + 5$, $x_n = \frac{n \cos n}{2n^2 + 1}$ و $w_n = n - \ln(n+2)$, $v_n = ne^{-2n+1}$

- 1- ادرس اتجاه تغير كل من (u_n), (v_n) و (w_n).
- 2- بين أن (v_n) محدودة من الأسفل بالعدد 0 أي $v_n > 0$.
- 3- ادرس تقارب كل من (u_n), (v_n), (w_n) و (x_n).

تمرين 20

(u_n) $_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية معرفة بـ: $\begin{cases} u_0 = 1, & u_1 = 3 \\ 3u_{n+2} = 4u_{n+1} - u_n \end{cases}$

- 1- بين أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$.
- 2- بين أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 4 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$.

تمرين 21

(u_n) متتالية عددية معرفة بحددها الأول $u_0 = 4$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$.
 f دالة معرفة على \mathbb{R}^+ بـ: $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ وليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- 1- ارسم البيان (\mathcal{C}) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$.
 - مثل على المحور $(O; \vec{i})$ الحدود u_0, u_1, u_2, u_3 ؛ مبرزا خطوط الرسم ثم خمن تغيرات المتتالية (u_n) ونهايتها.
- 2- لتكن (v_n) متتالية معرفة بـ: $v_n = u_n - 2$.
 برهن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب حساب أساسها q .
 - اكتب عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n .
 - ادرس تغيرات (u_n) ثم حسب نهايتها لما $n \rightarrow +\infty$.

$l = 2$	$2 + 2^{-n+1}$	2^{-n+1}	$q = \frac{1}{2}$
---------	----------------	------------	-------------------

تمرين 22

(u_n) متتالية عددية حدودها موجبة تماما معرفة بحددها الأول $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{u_n}$.
 1- برهن أنه من أجل كل $n \geq 0$ فإن $u_n \neq 2$.

2- f دالة معرفة على \mathbb{R}_+^* بـ: $f(x) = \frac{x+2}{x}$ وليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- ادرس تغيرات f ثم ارسم المنحني (\mathcal{C}) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$. (وحدة الطول 2cm).

- مثل على المحور $(O; \vec{i})$ الحدود u_0, u_1, u_2, u_3 دون حساب، مبرزا خطوط الرسم ثم خمن نهاية المتتالية (u_n) .

3- لتكن (v_n) متتالية معرفة بـ: $v_n = \frac{u_n + 1}{u_n - 2}$.

- برهن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب حساب أساسها q .
 - اكتب عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n .
 - احسب نهاية u_n لما $n \rightarrow +\infty$.

$l = 2$	$\frac{2(-2)^{n+1} + 1}{(-2)^{n+1} - 1}$	$(-2)^{n+1}$	$q = -2$
---------	--	--------------	----------

تمرين 23

(u_n) متتالية عددية معرفة بحددها الأول $u_1 = 19$ ومن أجل كل عدد طبيعي $n \geq 1$: $u_{n+1} = \frac{2n}{n+1}u_n - 1$.

لتكن (v_n) متتالية معرفة بـ: $v_n = n(u_n - 1) - 2$.

- 1- برهن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب حساب أساسها q .
- 2- اكتب عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n .
- 3- ادرس تغيرات المتتالية (v_n) .
- 4- احسب المجموع: $S_n = \sum_{p=1}^n v_p = v_1 + v_2 + \dots + v_n$.

$2^{n+4} - 16$	$\frac{2^{n+3} + n + 2}{n}$	2^{n+3}	$q = 2$
----------------	-----------------------------	-----------	---------

تمرين 24

(u_n) متتالية عددية معرفة بحددها الأول $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي $n \geq 1$: $u_n = \alpha u_{n-1} + 2$. $0 < \alpha < 1$.

لتكن (v_n) متتالية معرفة بـ: $v_n = u_n + \frac{2}{\alpha - 1}$.

- 1- برهن أنه من أجل كل $n \geq 0$ فإن $u_n > 0$.
- 2- برهن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب حساب أساسها q .
- 3- اكتب عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n .
- 4- احسب نهاية u_n لما $n \rightarrow +\infty$.

5- احسب المجموعين: $S'_n = \sum_{p=0}^{n-1} u_p$ و $S_n = \sum_{p=0}^{n-1} v_p$.

$S'_n = \frac{(\alpha + 1)(\alpha^n - 1)}{(\alpha - 1)^2} - \frac{2n}{\alpha - 1}$	$l = \frac{2}{1 - \alpha}$	$q = \alpha$
--	----------------------------	--------------

تمرين 25

(u_n) متتالية عددية معرفة كما يلي:

$$\begin{cases} u_0 = 1, u_1 = 3 \\ 3u_{n+1} - 4u_n = -u_{n-1} \quad n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = u_{n+1} - u_n$.

- 1- برهن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{3}$.
- 2- احسب المجموع: $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_{n-1}$.
- 3- أثبت أن: $S_n = u_n - u_0$. استنتج عبارة u_n بدلالة n .

$4 - 3^{-n+1}$	$3 - 3^{-n+1}$
----------------	----------------

تمرين 26

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ متتالية عددية معرفة بـ: $u_n = \frac{1}{4n^2 - 1}$.

- 1- برهن أن $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ متناقصة تماما.
- 2- عين العددين α و β بحيث: $u_n = \frac{\alpha}{2n+1} + \frac{\beta}{2n-1}$.
- 3- احسب المجموع: $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$.
- احسب نهاية S_n لما $n \rightarrow +\infty$.

$l = \frac{1}{2}$	$S_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2(2n+1)}$	$u_n = \frac{-1}{2(2n+1)} + \frac{1}{2(2n-1)}$
-------------------	---	--

المتتاليات المتجاورتان

تمرين 30

نعتبر المتتاليتين u و v المعرفتين من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ بـ:

$$v_n = \frac{2n+3}{n+1} \quad \text{و} \quad u_n = \frac{2n+1}{n+1}$$

1- بين أن u و v متتاليتان متجاورتان.

2- احسب النهاية المشتركة لهما.

تمرين 31

نعتبر المتتاليتين u و v المعرفتين من أجل كل $n \in \mathbb{N}^*$ بـ:

$$u_n = \frac{1}{2 \times 1} + \frac{1}{4 \times 3} + \frac{1}{6 \times 5} + \dots + \frac{1}{2n(2n-1)}$$

$$v_n = u_n + \frac{1}{2n+1}$$

1- بين أن u و v متتاليتان متجاورتان.

2- احسب u_4 و v_4 . استنتج أن نهايتهما $0,63 < l < 0,74$.

تمرين 32 Examen USTHB (Fev 2009)

(u_n) و (v_n) متتاليتان معرفتان من أجل كل عدد طبيعي n :

$$\begin{cases} v_0 = 4 \\ v_{n+1} = \frac{u_{n+1} + v_n}{2} \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \end{cases}$$

1- احسب u_1, v_1, u_2, v_2 .

2- لتكن المتتالية (w_n) معرفة، من أجل كل عدد طبيعي n ,

$$w_n = v_n - u_n$$

(أ) برهن أن المتتالية (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{4}$.

(ب) اكتب عبارة w_n بدلالة n وحدد نهاية المتتالية (w_n) .

3- (أ) ادرس تغيرات المتتاليتين (u_n) و (v_n) .

(ب) بين أن هاتين المتتاليتين متجاورتين. ماذا تستنتج؟

4- لتكن (t_n) متتالية معرفة بـ: $t_n = \frac{u_n + 2v_n}{3}$ ، $n \in \mathbb{N}$

بين أن (t_n) ثابتة. استنتج نهاية المتتاليتين (u_n) و (v_n) .

$$l = \frac{11}{3} \quad w_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n$$

تمرين 27

(u_n) متتالية عددية معرفة بحددها الأول $u_0 = 3\alpha + 1$

ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $2u_{n+1} = u_n + 4\alpha$.

1- عين قيمة العدد الحقيقي α حتى تكون (u_n) ثابتة.

في باقي التمرين نفرض أن (u_n) غير ثابتة ونضع من أجل

كل عدد طبيعي n ، $v_n = u_n - 2\beta$.

2- أوجد علاقة بين α و β حتى تكون (v_n) متتالية هندسية

يطلب حساب أساسها q وحددها الأول v_0 .

3- اكتب عبارة u_n بدلالة n و α ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

4- ادرس تغيرات المتتالية (v_n) . ناقش حسب قيم α .

5- احسب المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

$2(1-\alpha)(1-2^{-n-1}) + 4\alpha(n+1)$	$(1-\alpha)2^{-n} + 4\alpha$	$\beta = 2\alpha$	1
--	------------------------------	-------------------	---

تمرين 28 Bac S Inde 2004

1- (u_n) متتالية معرفة بحددها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل كل

عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{1}{2 - u_n}$

(أ) احسب الحدود u_1, u_2, u_3 . عبر عن كل حد على شكل كسر غير قابل للاختزال.

(ب) قارن بين الحدود الأربعة الأولى للمتتالية u والحدود

الأربعة الأولى للمتتالية w المعرفة على \mathbb{N} بـ: $w_n = \frac{n}{n+1}$.

(ج) برهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ فإن $u_n = w_n$.

2- لتكن (v_n) متتالية معرفة بـ: $v_n = \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$

(أ) برهن أن $v_1 + v_2 + v_3 = -\ln 4$.

(ب) احسب بدلالة n المجموع: $S_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n$.

- احسب نهاية S_n لما n يؤول إلى $+\infty$.

$$S_n = -\ln(n+1)$$

تمرين 29

(u_n) متتالية عددية حدودها موجبة، معرفة بحددها الأول

$u_1 = e^3$ ومن أجل كل عدد طبيعي $n > 1$: $(u_n)^2 e = u_{n-1}$.

لتكن (v_n) متتالية معرفة بـ: $v_n = \frac{1 + \ln u_n}{2}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)

1- برهن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب حساب أساسها q و v_1 .

2- اكتب عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n .

3- احسب المجموع: $S_n = \sum_{p=1}^n v_p$ والجداء: $P_n = \prod_{p=1}^n u_p$

- احسب نهاية S_n ونهاية P_n لما $n \rightarrow +\infty$.

$e^{8-2^{-n+3}} - n$	$4 - 2^{-n+2}$	$e^{2^{-n+3}} - 1$	2^{-n+2}	2	$\frac{1}{2}$
----------------------	----------------	--------------------	------------	---	---------------

الدوال الأصلية

Calcul de Primitivesتمرين 1عين مجموعة الدوال الأصلية للدالة f على المجال I .

$$I = \mathbb{R} \quad f(x) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 + 7 \quad (1)$$

$$I =]0; +\infty[\quad f(x) = 2x + \frac{3}{x^2} - \frac{3}{2\sqrt{x}} \quad (2)$$

$$I = \mathbb{R}^* \quad f(x) = \frac{3x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 5}{x^2} \quad (3)$$

$$I =]1; +\infty[\quad f(x) = \sqrt{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \quad (4)$$

$$I = \mathbb{R} - \{-2\} \quad f(x) = \frac{1}{(3x+6)^2} + \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}} \quad (5)$$

$$I = \mathbb{R} \quad f(x) = 4x(x^2+4)^2 + x^3(x^4+3)^3 \quad (6)$$

$$I = \mathbb{R} - \{2\} \quad f(x) = (x^2-1)^2 + \frac{3}{(2-x)^2} \quad (7)$$

$$I =]-\infty; -1[\quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-2x}} + \frac{x^2+2x}{x^2+2x+1} \quad (8)$$

$$I = \mathbb{R} \quad f(x) = 2\sin x - 5\cos(x+1) \quad (9)$$

$$I = \mathbb{R} \quad f(x) = 6\sin(3x+\pi) + 3\cos(2x+\pi) \quad (10)$$

$$I = \mathbb{R} \quad f(x) = \cos x(\sin x + 2) \quad (11)$$

$$I = \mathbb{R} \quad f(x) = \sin x \sqrt{\cos x + 1} \quad (12)$$

$$I = \mathbb{R} \quad f(x) = \sin x \cos^3 x \quad (13)$$

$$I = \mathbb{R} \quad f(x) = \sin 2x \cos 2x \quad (14)$$

$$I = \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{\sin x - \cos x}{\sqrt{\sin x + \cos x + 2}} \quad (15)$$

$$I = \mathbb{R} \quad f(x) = 2\sin^2 x - 4\cos^2 x \quad (16)$$

$$I = \mathbb{R} \quad f(x) = \cos^2 x \sin^3 x \quad (17)$$

$$I = \left[0; \frac{\pi}{2}\right[\quad f(x) = \tan x(1 + \tan^2 x) \quad (18)$$

تمرين 2عين مجموعة الدوال الأصلية للدالة f على المجال I .

$$I = \mathbb{R} \quad f(x) = (2x-1)e^{x^2-x} \quad (1)$$

$$I = \mathbb{R} \quad f(x) = e^{2x+1} - 2x \quad (2)$$

$$I = \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{e^{3x} + e^{2x} + 3}{e^x} \quad (3)$$

$$I = \mathbb{R} \quad f(x) = 1 + \frac{e^x}{e^x + 3} \quad (4)$$

$$I = \mathbb{R} \quad f(x) = e^{-x} \sqrt{e^{-x} + 1} \quad (5)$$

$$I = \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{e^{2x}}{e^{2x} + 1} \quad (6)$$

$$I = \mathbb{R}^* \quad f(x) = \frac{e^{2x}}{e^x - 1} \quad (7)$$

$$I = \mathbb{R} \quad f(x) = 3^{x-1} + 3^{-x+1} \quad (8)$$

$$I = \mathbb{R}^* \quad f(x) = 2x - 1 + \frac{3}{x} \quad (9)$$

$$I =]2; +\infty[\quad f(x) = \frac{3}{x+1} + \frac{1}{2x-4} \quad (10)$$

$$I =]1; 2[\quad f(x) = \frac{2x}{x^2-4} + \frac{1}{(x-1)^2} \quad (11)$$

$$I =]0; +\infty[\quad f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + x - 1}{x^2} \quad (12)$$

$$I =]2; +\infty[\quad f(x) = \frac{3x+3}{x^2+2x+2} + \frac{1}{2-x} \quad (13)$$

$$I = \left] -\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6} \right[\quad f(x) = \frac{\cos x}{1+2\sin x} \quad (14)$$

$$I = \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \quad f(x) = \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} \quad (15)$$

$$I = \left]0; \frac{\pi}{4}\right[\quad f(x) = \tan 2x + \frac{1}{\tan 2x} \quad (16)$$

$$I =]1; +\infty[\quad f(x) = \frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x \ln x} \quad (17)$$

$$I =]-1; +\infty[\quad f(x) = \frac{x-1+\ln(x+1)}{x+1} \quad (18)$$

تمرين 3بين في كل حالة أن الدالة F دالة أصلية للدالة f على \mathbb{R} :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+3}} \quad F(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+3}) \quad (1)$$

$$f(x) = (x^2+2)\cos x \quad F(x) = x^2 \sin x + 2x \cos x \quad (2)$$

تمرين 4 f دالة معرفة على \mathbb{R} بـ: $f(x) = e^x \ln(1+e^x)$.

$$1- \text{بين أن: } f(x) - f'(x) = \frac{e^x}{1+e^x} - e^x$$

2- استنتج دالة أصلية للدالة f على \mathbb{R} والتي تنعدم عند 0.

الحساب التكاملي

Calcul Intégrale

بوزريعة: ربيع الثاني 1432 هـ

تمرين 1

احسب التكامل I في كل حالة من الحالات التالية:

$$I = \int_1^2 (2x^3 + x^2 - 2x - 1) dx \quad (1)$$

$$I = \int_{-1}^3 (2x+1)(x^2+x-4)^2 dx \quad (2)$$

$$I = \int_7^{\sqrt{7}} x\sqrt{2x^2+2} dx \quad (3)$$

$$I = \int_4^7 \left[\frac{1}{(x-3)^2} - \frac{1}{(2x-5)^2} \right] dx \quad (4)$$

$$I = \int_{-3\ln 2}^{-\ln 3} \frac{e^{-x}}{\sqrt{e^{-x}+1}} dx \quad (6) \quad I = \int_{-\ln 2}^{\ln 2} \frac{e^x}{e^x+1} dx \quad (5)$$

$$I = \int_{\frac{3}{2}}^2 \frac{5x^2-6x+2}{2x^2-3x+1} dx \quad (7) \quad \text{لاحظ وجود ثلاثة أعداد}$$

حقيقية a, b, c بحيث من أجل كل عدد حقيقي $x > 1$ فإن:

$$\frac{5x^2-6x+2}{2x^2-3x+1} = a + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{2x-1}$$

$$I = \int_0^3 (|x-2|-1) dx \quad (8) \quad \text{(استعمل علاقة شال)}$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2(\cos x + \sin 2x) dx \quad (9)$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos x \sin^2 x dx \quad (10)$$

$$I = \int_{-1}^1 \frac{\sin 2x}{x^2+1} dx \quad (12) \quad I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{2 \tan 2t}{\cos^2 2t} dt \quad (11)$$

$$I = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos^4 x dx \quad (13) \quad \text{يمكن كتابة } \cos^4 x \text{ بدلالة}$$

 $\cos 2x$ و $\cos 4x$ (العبارة الخطية)

$$I = \int_{-1}^0 (2x^2 + 3x) e^{-x} dx \quad (7) \quad \text{(كامل مرتين)}$$

$$I = \int_0^{\pi} (x^2 + 3x - 5) \sin(2x + \pi) dx \quad (8) \quad \text{(كامل مرتين)}$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^x \sin x dx \quad (10) \quad I = \int_1^e (\ln x)^2 dx \quad (9)$$

$2e-7$	$\frac{ne^{n+1}+1}{(n+1)^2}$	$4\ln 2-3\ln 3$	210	$\frac{4}{15}$	$\pi+2$	2
--------	------------------------------	-----------------	-------	----------------	---------	-----

$\frac{1}{2}$	$e-2$	$\frac{\pi(\pi+3)}{2}$
---------------	-------	------------------------

تمرين 3

 f دالة معرفة على $]-\infty; \frac{5}{2}]$ بـ: $f(x) = x\sqrt{-2x+5}$ g دالة معرفة بـ: $g(x) = (ax^2 + bx + c)\sqrt{-2x+5}$

1- عين الأعداد الحقيقية a, b, c بحيث من أجل كل $x < \frac{5}{2}$ تكون الدالة g دالة أصلية للدالة f .

2- استنتج حساب التكامل التالي: $I = \int_{-2}^2 f(x) dx$

3- احسب القيمة المتوسطة μ لـ f على $[-2; 2]$.

$-\frac{19}{30}$	$-\frac{38}{15}$	$-\frac{5}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{5}$
------------------	------------------	---

تمرين 4

نعتبر التكاملين: $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos^2 x dx$ و $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin^2 x dx$

1- احسب: $I+J$ و $I-J$.

2- استنتج حساب قيمتي: I و J .

$\frac{\pi^2+4}{16}, \frac{\pi^2-4}{16}$	$-\frac{1}{2}, \frac{\pi^2}{8}$
--	---------------------------------

تمرين 5

 n عدد طبيعي. نعتبر التكامل: $I_n = \int_0^1 x^n \sin \pi x dx$

1- ادرس تغيرات I_n .

2- احسب: I_0 و I_1 .

3- أوجد علاقة بين I_n و I_{n-2} . (كامل بالتجزئة مرتين)

4- استنتج حساب قيمتي: I_2 و I_3 .

$\frac{1}{\pi} - \frac{6}{\pi^3}$	$\frac{1}{\pi} - \frac{4}{\pi^3}$	$I_n = \frac{1}{\pi^2} [\pi - n(n-1)I_{n-2}]$	$\frac{1}{\pi}$	$\frac{2}{\pi}$
-----------------------------------	-----------------------------------	---	-----------------	-----------------

تمرين 2

بإستعمال المكاملة بالتجزئة، احسب التكامل I في كل حالة:

$$I = \int_{-2}^0 (x+3)e^x dx \quad (1)$$

$$I = \int_0^{\pi} (x+1) \sin x dx \quad (2)$$

$$I = \int_4^{40} \frac{2x-3}{\sqrt{2x+1}} dx \quad (4) \quad I = \int_0^1 x\sqrt{1-x} dx \quad (3)$$

$$I = \int_1^e x^n \ln x dx \quad (6) \quad I = \int_1^2 \ln \frac{x}{x+1} dx \quad (5)$$

حساب المساحات

Calculs d'aires


بوزريعة: ربيع الثاني 1432 هـ

تمرين 3

نعتبر الدالة f المعرفة على \mathbb{R} بـ:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x - 3 & x \geq -1 \\ 2 & x \leq -1 \end{cases}$$

وليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني المبين أسفله.



- 1- باستعمال المكاملة بالتجزئة احسب $\int_{-4}^{-1} x e^{x+1} dx$.
- 2- احسب مساحة الحيز المحدد بالمنحني (\mathcal{C}) محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتها: $x = -4$ و $x = 3$.

$\frac{19+15e^{-3}}{3} u.a \approx 6,58 u.a$	$-2+5e^{-3}$
--	--------------

تمرين 4

نعتبر الدالة f المعرفة على $0; +\infty$ بـ:

$$f(x) = x - \frac{4}{e^x - 1}$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

- 1- احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. استنتج أن المنحني

(\mathcal{C}) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما (Δ) معادلته $y = x$.

- ادرس وضعية المنحني (\mathcal{C}) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

- ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

2- برهن أن المنحني (\mathcal{C}) يقطع محور الفواصل عند نقطة

فاصلتها α حيث: $1,3 < \alpha < 1,4$. ارسم المنحني (\mathcal{C}) .

3- عين الأعداد الحقيقية a, b, c بحيث من أجل كل عدد

حقيقي $x > 0$ فإن: $f(x) = ax + b + \frac{ce^x}{e^x - 1}$

4- احسب المساحة $A(\lambda)$ ($\lambda > \ln 2$) لمجموعة النقط $M(x; y)$

حيث: $\ln 2 \leq x \leq \lambda$ و $f(x) \leq y \leq x$. احسب $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda)$.

- بيّن أن $A(\alpha) = -4(\alpha + \ln \alpha - 3 \ln 2)$. احصر $A(\alpha)$.


$4 \ln 2 u.a$	$4[-\lambda + \ln 2 + \ln(e^\lambda - 1)] u.a$
---------------	--

تمرين 1

نعتبر الدالة f المعرفة على $]-1; +\infty$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 3}{x^2 + 2x + 1}$$

وليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس المبين أسفله.



1- عين العددين الحقيقيين a و b بحيث من أجل كل عدد

حقيقي $x > -1$ فإن: $f(x) = a + \frac{b}{(x+1)^2}$.

2- احسب مساحة الحيز المحدد بالمنحني (\mathcal{C}) والمستقيمتين $x = 1$ و $x = 3$ ، و $y = 0$.

3- احسب $I = \int_0^3 \frac{2}{(x+1)^2} dx$. أعط تفسيراً بيانياً لـ I .

$1,5 u.a$	$2,5 u.a$
-----------	-----------

تمرين 2

نعتبر الدالة f المعرفة على $]-\infty; 2$ بـ:

$$f(x) = (x^2 - x - 1)e^x$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1- (أ) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. استنتج أن المنحني (\mathcal{C}) يقبل

مستقيماً مقارباً يطلب كتابته معادلته.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

(ج) عين نقاط تقاطع (\mathcal{C}) مع المحورين ثم ارسم (\mathcal{C}) .

2- g دالة معرفة بـ: $g(x) = (ax^2 + bx + c)e^x$.

عين الأعداد الحقيقية a, b, c بحيث من أجل كل $x \leq 2$

تكون الدالة g دالة أصلية للدالة f .

3- احسب مساحة الحيز المحدد بالمنحني (\mathcal{C}) محور

الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتها: $x = 0$ و $x = 1$.

4- احسب $I = \int_{-2}^0 f(x) dx$. هل I يعبر عن مساحة؟ علل.

$2 - 12e^{-2}$	$2 u.a$	$2; -3; 1$
----------------	---------	------------

تمارين 5

نعتبر الدالة f المعرفة على $[-1; 1]$ بـ:

$$f(x) = (x+1)\sqrt{x+1} + x$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1- شكل جدول تغيرات الدالة f ثم ارسم بيانها (\mathcal{C}) .

2- احسب $I = \int_{-1}^0 (x+1)\sqrt{x+1} dx$. فسر بيانيا I .

$$0,4 \text{ u.a}$$

تمارين 6

نعتبر الدالتين f و g المعرفتين على \mathbb{R} بـ:

$$g(x) = x^2 + x - 2 \quad f(x) = -x^2 + 2x - 1$$

1- شكل جدول تغيرات كل من f و g ثم ارسم بدقة

بيانيهما (\mathcal{C}) و (\mathcal{C}') على الترتيب في معلم متعامد

ومتجانس حيث وحدة الطول 2cm.

2- ادرس وضعية (\mathcal{C}) بالنسبة لـ (\mathcal{C}') . حدد نقطتي تقاطعهما.

3- احسب بـ cm^2 المساحة A لمجموعة النقط $M(x; y)$

من المستوي بحيث: $g(x) \leq y \leq f(x)$.

$$4,5 \text{ cm}^2$$

تمارين 7

نعتبر الدالة f المعرفة على $0; +\infty[$ بـ:

$$f(x) = \frac{1+2\ln x}{x}$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1- احسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. استنتج أن المنحني

(\mathcal{C}) يقبل مستقيمين مقاربين يطلب كتابة معادليهما.

- ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

- ادرس وضعية (\mathcal{C}) بالنسبة لحامل محور الفواصل.

- ارسم المنحني (\mathcal{C}) . وحدة الطول 2cm.

2- احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المحدد بالمنحني (\mathcal{C}) محور

الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = \frac{1}{e}$ و $x = \sqrt{e}$.

$$5 \text{ cm}^2$$

تمارين 8

نعتبر الدالة f المعرفة على \mathbb{R} بـ:

$$f(x) = 2\cos^2 x - 2\cos x - 1,5$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1- شكل جدول تغيرات الدالة f ثم ارسم بيانها (\mathcal{C}) .

2- احسب المساحة A لمجموعة النقط $M(x; y)$ حيث:

$$f(x) \leq y \leq -f(x) \quad \text{و} \quad -\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$$

$$\frac{4\pi}{3} + 5\sqrt{3} \text{ u.a}$$

تمارين 9

نعتبر الدالة f المعرفة على $0; +\infty[$ بـ:

$$f(x) = \frac{x+1}{x} + \ln x$$

ليكن (\mathcal{C}) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1- ادرس النهايات، اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول

تغيراتها. احسب $f(2)$ و $f(6)$ ثم ارسم المنحني (\mathcal{C}) .

2- n عدد طبيعي غير معدوم. احسب المساحة u_n للحيز

المحدد بالمنحني (\mathcal{C}) محور الفواصل والمستقيمين اللذين

معادلتاهما: $x = n$ و $x = n+1$.

- احسب: $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$.

$$(n+2)\ln(n+1) \quad (n+2)\ln(n+1) - (n+1)\ln(n)$$

تمارين 10 Bac S Antilles-Guyane 2005

نعتبر الدالة f المعرفة على $0; +\infty[$ بـ:

$$f(x) = \frac{2\ln x}{x^2 + x}$$

1- بين أنه من أجل كل $x > 1$ ، $\frac{\ln x}{x^2} \leq f(x) \leq \frac{\ln x}{x}$.

2- (أ) احسب $I = \int_2^4 \frac{\ln x}{x} dx$ و $J = \int_2^4 \frac{\ln x}{x^2} dx$ (يمكن

استعمال المكاملة بالتجزئة لحساب J).


(ب) استنتج حصرا لـ $K = \int_2^4 f(x) dx$.

3- الشكل التالي يمثل منحنى الدالة f (الوحدة هي 1cm على

محور الفواصل و 4cm على محور الترتيب). نعتبر مجموعة

النقط $M(x; y)$ حيث: $2 \leq x \leq 4$ و $0 \leq y \leq f(x)$. نرمز

بـ A إلى مساحتها.



باستعمال الحصر الموجود في السؤال 2- ب)، أعط حصرا

لـ A بـ cm^2 .

$$1 < A < 2,883 \text{ cm}^2 \quad \frac{1}{4} \quad \frac{3(\ln 2)^2}{2}$$

قابلية القسمة في \mathbb{Z} Divisibilité dans \mathbb{Z} تمرين 7

عين كل الثنائيات (x, y) من الأعداد الصحيحة التي تحقق:

$$(1) \quad (x-1)(2y-3)=11$$

$$(2) \quad 4x^2 - y^2 = 36$$

$$(3) \quad x^2y + xy^2 + 2 = 0$$

$$(4) \quad x^2 + 5y^2 = 45$$

$(-5,8) ; (-5,-8) ; (5,-8) ; (5,8) ; (-3,0) ; (3,0)$	$(-10,1) ; (0,-4) ; (12,2) ; (2,7)$
$(0,-3) ; (-5,-2) ; (-5,2) ; (5,-2) ; (5,2) ; (0,3)$	$(2,-1) ; (-1,2) ; (-1,-1)$

تمرين 8

1- حل العدد 608 إلى جداء عوامل أولية.

2- α و β عدنان طبيعيان.

نضع: $a = \alpha + 2\beta$ و $b = 2\alpha + 3\beta$

بين أن $PGCD(a, b) = PGCD(\alpha, \beta)$

3- عين مجموعة الأزواج الطبيعية (x, y) بحيث:

$$\begin{cases} (x+2y)(2x+3y) = 9728 \\ PGCD(x, y) = 4 \end{cases}$$

$(28,24)$	$19 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$
-----------	---

تمرين 9

n, a و b أعدادا طبيعية. عين قيم العدد n بحيث a يقسم b في كل حالة من الحالات التالية:

$$(1) \quad a = n+1 \text{ و } b = n+5 \text{ حيث } n \geq 0$$

$$(2) \quad a = n-1 \text{ و } b = 2n+3 \text{ حيث } n > 1$$

$$(3) \quad a = n-2 \text{ و } b = n^2 + 3n + 4 \text{ حيث } n > 2$$

$16, 9, 4, 3$	$6, 2$	$3, 1, 0$
---------------	--------	-----------

تمرين 10

n عدد طبيعي غير معدوم. ليكن: $a = 3n - 2$ و $b = n + 5$

1- عين القيم الممكنة للقاسم المشترك الأكبر للعددين a و b .

2- عين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون الكسر $\frac{a}{b}$ قابلا للاختزال (العدنان a و b غير أوليان فيما بينهما).

3- عين قيم n حتى يكون الكسر $\frac{a}{b}$ عددا طبيعيا.

4- أثبت أن العددين: $a + 6$ و $2b - 7$ أوليان فيما بينهما.

12	$17k+12$	$17, 1$
----	----------	---------

تمرين 1

عين عددين طبيعيين a و b إذا علمت أن مجموعهما يساوي 99 وقاسمهما المشترك الأكبر يساوي 11.

$(55,44)$	$(77,22)$	$(88,11)$	$(44,55)$	$(22,77)$	$(11,88)$
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

تمرين 2

عين عددين طبيعيين a و b إذا علمت أن جداءهما يساوي 2700 وقاسمهما المشترك الأكبر يساوي 6.

$(150,18)$	$(450,6)$	$(18,150)$	$(6,450)$
------------	-----------	------------	-----------

تمرين 3

1- حل العدد الطبيعي 975 إلى جداء عوامل أولية.

2- عين عددين طبيعيين a و b أوليان فيما بينهما حيث:

$$a > b \text{ و } a \times b = 975$$

$(39,25) ; (75,13) ; (325,3) ; (975,1)$	$13 \times 5 \times 5 \times 3$
---	---------------------------------

تمرين 4

عين عددين طبيعيين a و b إذا علمت أن قاسمهما المشترك الأكبر يساوي 13 وأكبر هذين العددين يساوي 117.

$(104,117)$	$(91,117)$	$(65,117)$	$(52,117)$	$(26,117)$	$(13,117)$
$(117,104)$	$(117,91)$	$(117,65)$	$(117,52)$	$(117,26)$	$(117,13)$

تمرين 5

1- حل العدد الطبيعي 1432 إلى جداء عوامل أولية.

2- عين مجموعة الأزواج الطبيعية (x, y) بحيث:

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 5728 \\ PGCD(x, y) = 2 \end{cases}$$

$(362,354) ; (718,714)$	$179 \times 2 \times 2 \times 2$
-------------------------	----------------------------------

تمرين 6

α و β عدنان طبيعيان.

1- عين مجموعة الأزواج (α, β) بحيث $\alpha \times \beta = 51$.

2- استنتج مجموعة الأزواج الطبيعية (x, y) بحيث:

$$(أ) \quad x^2 - y^2 = 51$$

$$(ب) \quad x.y + 2x - 51 = 0$$

$$(ج) \quad x.y - 3x + 3y = 60$$

$(26,25) ; (10,7)$	$(17,3) ; (3,17) ; (51,1) ; (1,51)$
$(14,6) ; (0,20) ; (48,4)$	$(17,1) ; (3,15) ; (1,49)$

(أ) بين أن كل من العددين p و q يقبل القسمة على $n-5$.
 (ب) عيّن تبعا لقيم n وبدلالة n ، $PGCD(p; q)$.

$$d=n-5 \text{ أو } d=7(n-5) \quad 7k-5 \quad 7, 1$$

تمرين 16

1- عين القاسم المشترك الأكبر للعددين 8044 و 4022.
 2- عين أصغر عدد طبيعي x ، متكون من أربعة أرقام بحيث: باقي قسمة العدد 4024 على x هو 2 ، و باقي قسمة العدد 8048 على x هو 4.

2011

تمرين 17

1- أثبت أن عددين طبيعيين متتاليين أوليان فيما بينهما.
 2- بين أنه إذا كان a و b عددين أوليين فيما بينهما، فإن $a+b$ و $a \times b$ كذلك أوليان فيما بينهما.
 3- استنتج أن الكسر $\frac{2n+1}{n^2+n}$ غير قابل للاختزال. ($n \in \mathbb{N}$).
 4- عين قيمة العدد n حتى يكون $\frac{2n+1}{n^2+n} = \frac{15}{56}$.

7

تمرين 18 بكالوريا

n عدد طبيعي غير معدوم، نعتبر العددين $N=9n+1$ و $M=9n-1$.
 1- نفرض أن n زوجي. نضع $n=2p$ ، حيث p عدد طبيعي غير معدوم.
 (أ) بين أن M و N عددان فرديان.
 (ب) بملاحظة أن $N=M+2$ ، عين $PGCD(M; N)$.
 2- نفرض أن n فردي. نضع $n=2p+1$ ، حيث p عدد طبيعي.
 (أ) بين أن M و N عددان زوجيان.
 (ب) بملاحظة أن $N=M+2$ ، عين $PGCD(M; N)$.
 3- n عدد طبيعي غير معدوم، نعتبر العدد $81n^2-1$.
 (أ) عبر عن $81n^2-1$ بدلالة M و N .
 (ب) بين أنه إذا كان n زوجي فإن $81n^2-1$ فردي.
 (ج) بين $81n^2-1$ مضاعف لـ 4 إذا وفقط إذا n فردي.

تمرين 11

نعتبر العددين: $a=3n-1$ و $b=5n-4$ ، حيث $n \in \mathbb{N}^*$.
 1- ليكن d القاسم المشترك الأكبر لـ a و b . عين قيم d .
 2- بين أنه إذا كان $d=7$ ، فإن العدد 7 يقسم العدد $n+2$.
 3- عين قيمتي a و b حتى يكون $d=7$.

$$b=35k-14 ; a=21k-7 \quad 7, 1$$

تمرين 12

n عدد صحيح. نضع: $a=n-2$ و $b=2n^2-7n+17$.
 1- عين قيم العدد n بحيث b يقبل القسمة على a .
 2- ليكن (\mathcal{C}) منحنى الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{2x^2-7x+17}{x-2}$$

 عين نقط المنحنى (\mathcal{C}) التي إحداثياتها أعدادا صحيحة.

$$(3,14) ; (13,24) ; (1,-12) ; (-9,-22)$$

تمرين 13

n عدد طبيعي. نضع: $a=n+3$ و $b=2n^2+7n+4$.
 1- بين أن العدد a يقسم العدد $2n^2+7n+3$.
 2- استنتج أن العددين a و b أوليان فيما بينهما.
 3- عين قيم العدد n بحيث a يقسم العدد $b+7$.

$$5, 1$$

تمرين 14

n عدد طبيعي.
 1- بين أن العددين: $a=n^2+5n+6$ و $b=n^2+6n+8$ يقبلان القسمة على $n+2$.
 2- بين أن $n+2$ هو القاسم المشترك الأكبر لـ a و b .
 3- عين قيم العدد n بحيث العدد $c=2n^2+5n+11$ يقبل القسمة على $n+2$.
 4- استنتج أن العدد c غير قابل للقسمة على a و b .

$$7, 1$$

تمرين 15 بكالوريا 2008 تقني رياضي

n عدد طبيعي أكبر من 5.
 1- a و b عددان طبيعيين حيث $a=n-2$ و $b=2n+3$.
 (أ) ما هي القيم الممكنة للقاسم المشترك الأكبر للعددين a و b ؟
 (ب) بين أن العددين a و b من مضاعفات 7 إذا وفقط إذا كان $n+5$ مضاعفا للعدد 7.
 (ج) عين قيم n التي يكون من أجلها $PGCD(a; b)=7$.
 2- نعتبر العددين الطبيعيين p و q حيث:

$$q=n^2-7n+10 \quad \text{و} \quad p=2n^2-7n-15$$

الموافقات في \mathbb{Z}

Congruence

تمرين 5

- 1- عين حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعددين 4^n و 5^n على 7.
- 2- بين أنه $\forall n \in \mathbb{N}^*$ فإن: $39^{3n+2} + 40^{6n-5} \equiv 0 [7]$.
- 3- عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون باقي قسمة كل من العددين 4^n و 5^n على 7 هو 1.
- 4- حل في \mathbb{N} : $1432^x + 1433^x + 1434^x \equiv 0 [7]$.

$$6k+4 ; 6k+2 \quad 6k$$

تمرين 6

- 1- عين حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي قسمة 5^n على 9.
- 2- بين أنه $\forall n \in \mathbb{N}^*$: $24^{98n} + 25^{99n} + 26 \equiv 0 [9]$.
- 3- عين قيم n بحيث يكون: $5 [9] \equiv -8^{2n+1} + n^2 - 3n$.
- 4- عين الأعداد الصحيحة λ التي تحقق الجملة التالية:

$$\begin{cases} 5^{6n+2} + 4\lambda \equiv 0 [9] \\ -13 < \lambda \leq 30 \end{cases}$$

$$\lambda = \{-4, 5, 14, 23\} \quad 9k+8 ; 9k+4$$

تمرين 7

- 1- نعتبر العددين الطبيعيين: $a = 413^{(5)}$ و $b = 102^{(3)}$.
- (أ) اكتب كل من a و b في النظام العشري.
- (ب) احسب في النظام ذي الأساس 7 العددين $a+b$ و $a \times b$.
- 2- عين العدد x في الحالتين التاليتين:
 (أ) $\overline{12}^{(x)} \times \overline{34}^{(x)} = \overline{452}^{(x)}$ (ب) $\overline{xxx}^{(9)} = 52\alpha^{(11)}$

$$7 \quad 6 \quad \overline{3315}^{(7)} \quad \overline{230}^{(7)} \quad 108 \quad 11$$

تمرين 8 بكالوريا 2010 تقني رياضي

- نعتبر العدد الطبيعي n الذي يكتب في نظام العد ذي الأساس 7 كما يلي: $n = 11\alpha 00$ حيث α عدد طبيعي.
- 1- عين العدد α حتى يكون n قابلا للقسمة على 3.
 - 2- عين العدد α حتى يكون n قابلا للقسمة على 5.
 - استنتج قيمة α التي تجعل n قابلا للقسمة على 15.
 - 3- نأخذ $\alpha = 4$ اكتب العدد n في النظام العشري.

$$2940 \quad 4 \quad 4 \quad 4, 1$$

تمرين 1

- 1- عين حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي قسمة 3^n على 5.
- 2- ما هو باقي قسمة العدد 123^{456} على 5؟
- 3- برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n يكون العدد:
 $48^{4n+3} - 2 \times 9^{2n+1} + 1$ مضاعفا للعدد 5.
- 4- عين الأعداد الطبيعية n بحيث يكون العدد:
 $3^{4n} + 3^n - 4$ قابلا للقسمة على 5.

$$4k+1 \quad 1$$

تمرين 2 بكالوريا 2010 تقني رياضي

- 1- عين حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 10^n على 13.
- 2- تحقق أن: $10^{2008} + 10^{2008} + 1 \equiv 0 [13]$.
- 3- عين قيم n بحيث يكون: $10^{2n} + 10^n + 1 \equiv 0 [13]$.

$$6k+4 ; 6k+2$$

تمرين 3

- 1- عين حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي قسمة 7^n على 9.
- 2- ليكن: $a = 925^{34}$ و $b = 88^{3n+2}$
- (أ) عين باقي قسمة العدد: $2a - 3b - 39$ على 9.
- (ب) عين الأعداد الطبيعية n بحيث: $a - b + 3n \equiv 0 [9]$.
- 3- بين أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $7^{2n} + 7^n + 7 \equiv 0 [9]$.

$$3k+2 \quad 8$$

تمرين 4

- 1- عين تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي قسمة 9^n على 11.
- 2- عين قيم الأعداد الطبيعية n بحيث يكون:
 (أ) $100^n + 97^{n+1} + 5$ مضاعفا للعدد 11.
 (ب) $9^{5n+2} + n^2 - 16$ مضاعفا للعدد 11.
- 3- عين تبعا لقيم العدد الطبيعي n باقي قسمة العدد:
 $10 - 2 \times 10^n + 2012^{1433}$ على 11.

$$9 \quad 2 \quad 11k+10 ; 11k+1 \quad 5k+3$$

القواسم والمضاعفات

Diviseurs et multiples communs

3- حل في مجموعة الأعداد الطبيعية الجملة التالية:

$$\begin{cases} 5(2-x) = -4(y+1) \\ x^2 - y^2 \geq 0 \end{cases}$$

$$(14,14); (10,9); (6,4) \quad (20k'+2, 25k'-1); (20k'-2, 25k'-6) \quad (4k+2, 5k-1)$$

تمرين 5 بكالوريا

1- أثبت أن العددين 993 ، 170 أوليان فيما بينهما.

2- نعتبر في المجموعة \mathbb{Z}^2 المعادلة (E) ذات المجهولين

$$993x - 170y = 143$$

(i) عين الحل الخاص (x_0, y_0) ، للمعادلة (E) بحيث:

$$x_0 + y_0 = 6$$

(ب) حل في \mathbb{Z}^2 المعادلة (E).3- أوجد أصغر عدد طبيعي a بحيث يكون باقي قسمةالعدد $(a-1)$ على كل من العددين 1986 و 340 هو 14 و 300 على الترتيب.

$$2001 \quad (170k+1, 993k+5) \quad (1,5)$$

تمرين 61- عين الأعداد الصحيحة x بحيث: $7x \equiv -19[9]$

2- استنتج في مجموعة الأعداد الصحيحة حلول المعادلة:

$$7x - 9y = -19 \quad \dots [I]$$

3- من بين حلول المعادلة [I] عين تلك التي تحقق:

$$x \equiv 0[y] \quad (\text{أي } y \text{ يقسم العدد } x)$$

4- نعتبر العدد الطبيعي n الذي يكتب $2\alpha 5$ في نظام العدذي الأساس 7، ويكتب $1\beta 3$ في نظام العد ذيالأساس 9. عين α و β ثم اكتب n في النظام العشري.

$$n=138, \beta=6, \alpha=5 \quad (-4,-1) \quad (9k+5, 7k+6) \quad 9k+5$$

تمرين 7

نعتبر في مجموعة الأعداد الصحيحة المعادلة:

$$7x + 13y = 119 \quad \dots [I]$$

1- أثبت أنه إذا كانت الثنائية (x, y) حلا للمعادلة [I] فإن y مضاعف للعدد 7. استنتج جميع حلول المعادلة [I].2- عين الأعداد الطبيعية α ، β و γ (غير معدومة) بحيث:

$$\overline{\alpha\gamma 1}^{(6)} + \overline{1\beta 3\beta}^{(8)} = \overline{32\gamma\alpha}^{(7)}$$

$$\gamma=5, \beta=7, \alpha=4 \quad (-13k+17, 7k)$$

تمرين 11- حل في $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ المعادلة: $3x - 8y = 1$.لاحظ أن الزوج $(3,1)$ حلها الخاص.

2- من بين حلول هذه المعادلة عين تلك التي تحقق:

$$y^2 - x = 5$$

3- حل في مجموعة الأعداد الصحيحة الجملة التالية:

$$\begin{cases} 21x - 56y = 7 \\ -5 \leq x < 27 \end{cases}$$

$$(-5,-2); (3,1); (11,4); (19,7) \quad (11,4) \quad (8k+3, 3k+1)$$

تمرين 2

1- عين القاسم المشترك الأكبر للأعداد التالية:

$$2189, 1393, 398$$

2- حل في $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ المعادلة: $2189x + 1393y = 398$ لاحظ أن الزوج $(-3, \alpha)$ حلها الخاص، حيث α عدد

صحيح يطلب تعيينه.

3- من بين حلول المعادلة السابقة عين تلك التي تحقق:

$$(i) \quad x < 11 \text{ و } y < 18$$

$$(b) \quad x^2 + 6y - 39 < 0$$

$$(4,-6); (11,-17) \quad (-10,16); (-3,5); (4,-6) \quad (7k-3, -11k+5)$$

تمرين 31- حل في $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ المعادلة (E): $85x - 51y = 0$ 2- من بين حلول المعادلة (E) عين الثنائيات (x, y)

$$\text{والتي تحقق: } |x - y| \leq 4$$

3- حل في مجموعة الأعداد الطبيعية المعادلتين التاليتين:

$$(i) \quad 85x - 51y = 867$$

$$(b) \quad 85x + 51y = 867$$

$$\begin{matrix} (-6,-10); (-3,-5); (0,0); (3,5); (6,10) & (3k,5k) \\ (9,2); (6,7); (3,12); (0,17) & (3k,5k-17) \quad k \geq 4 \end{matrix}$$

تمرين 4

1- حل في مجموعة الأعداد الصحيحة المعادلة التالية:

$$95(x-2) = 76(y+1) \quad \dots [I]$$

2- من بين حلول المعادلة [I] عين الثنائيات (α, β) والتي

$$\text{تحقق: } \alpha^2 \equiv \beta[5]$$

تمرين 8

- 1- بين أن العددين 27 و 22 أوليان فيما بينهما.
 - باستعمال خوارزمية إقليدس، عين عددين صحيحين a و b يحققان: $27a + 22b = 1$
 2- حل في $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ المعادلة: $405x - 330y = 15$
 3- استنتج في مجموعة الأعداد الصحيحة حل الجملة التالية:

$$\begin{cases} \lambda \equiv 0 [27] \\ \lambda \equiv 1 [22] \end{cases}$$

$$(594k' + 243) \mid (22k + 9, 27k + 11) \mid (9, -11)$$

تمرين 9

- نعتبر في مجموعة الأعداد الصحيحة المعادلتين:
 $2011x' - 2010y' = -1 \dots [I]$
 $2011x - 2010y = 3 \dots [II]$
 1- أثبت أن عددين طبيعيين متتابعين أوليان فيما بينهما.
 2- عين حلا خاصا للمعادلة [I].
 استنتج حلا خاصا للمعادلة [II].
 3- حل في مجموعة الأعداد الصحيحة المعادلة [II].
 4- لتكن (x, y) حلول المعادلة [II] في مجموعة الأعداد الطبيعية و d القاسم المشترك الأكبر لـ (x, y) .
 - ما هي القيم الممكنة للعدد d ?
 - عين الثنائيات (x, y) حلول المعادلة [II] بحيث يكون x و y غير أوليين فيما بينهما.

$$(6030l + 3, 6033l + 3) \mid 3, 1 \mid (2010k + 3, 2011k + 3) \mid (3, 3) \mid (-1, -1)$$

تمرين 10

- نعتبر في مجموعة الأعداد الطبيعية المعادلة:
 $4\alpha - 7\beta = 3 \dots [I]$
 1- عين حلا خاصا لهذه المعادلة وليكن (α_0, β_0) حيث $0 < \alpha_0 < 7$ ثم استنتج جميع حلولها.
 2- استنتج مما سبق حلول المعادلة التالية:
 $68x - 119y = 102 \dots [II]$
 حيث x و y عددان طبيعيين.
 3- ليكن d القاسم المشترك الأكبر للعددين الطبيعيين x و y حلول المعادلة [II]. ما هي القيم الممكنة للعدد d ?
 4- عين كل الثنائيات (α, β) حلول المعادلة [I] بحيث يكون $PGCD(\alpha; \beta) = 1$.

$$(7k' + 12, 4k' + 6) \mid k' \geq -1 \mid (7k + 6, 4k + 3) \mid k \geq 0 \mid (6, 3) \mid (21l + 13, 12l + 7) \mid (21l + 20, 12l + 11) \mid l \geq 0 \mid 6, 3; 2; 1$$

تمرين 11 بكالوريا

- 1- حل العدد الطبيعي 1995 إلى جداء عوامل أولية.
 2- عين كل الثنائيات (x, y) من الأعداد الطبيعية والتي تحقق: $x + 7y = 1995$ و $PGCD(x; y) = 19$
 $(1862, 19); (1729, 38); (1463, 76); (931, 152); (532, 209); (266, 247)$

تمرين 12

- x و y عددان طبيعيين؛ d قاسمهما المشترك الأكبر و m مضاعفهما المشترك الأصغر. عين كل الثنائيات (x, y) في كل حالة من الحالات التالية:

$$\begin{cases} m - d = 9 \\ x \leq y \end{cases} \quad -2 \quad \begin{cases} d = 3 \\ m = 120 \end{cases} \quad -1$$

$$\begin{cases} -d + m = y + 18 \\ d \geq 9 \end{cases} \quad -4 \quad \begin{cases} x + y = 30 \\ m + 6d = 45 \end{cases} \quad -3$$

$$(9, 18); (3, 12); (2, 5); (1, 10) \mid (24, 15); (120, 3); (15, 24); (3, 120) \mid (18, 27); (36, 9); (54, 18) \mid (27, 3); (3, 27)$$

تمرين 13 جامعة التكوين المتواصل

- 1- أ) حل العدد الطبيعي 1996 إلى جداء عوامل أولية.
 ب) عين مجموعة قواسم العدد 1996.
 بين أن جداء قواسم 1996 هو $8(998)^3$.
 ج) أوجد العددين الطبيعيين الذي مربع كل منهما يقسم العدد 1996.
 2- عين كل الثنائيات (x, y) من الأعداد الطبيعية التي تحقق: $2m^2 + 49d^2 = 1996$ ، حيث m هو المضاعف المشترك الأصغر لـ x و y و d هو القاسم المشترك الأكبر لـ x و y . ملاحظة: 499 عدد أولي.

$$(30, 2); (10, 6); (6, 10); (2, 30) \mid 2; 1 \mid 1996, 998, 499, 4, 2, 1$$

تمرين 14

- حافلة صغيرة لنقل المسافرين بها 16 راكبا مصنّفون إلى 3 أصناف: مجموعة دفعت 20 دج (صنف a) ومجموعة أخرى دفعت 15 دج (صنف b) أما المجموعة الثالثة فلم تدفع شيئا (صنف c). إذا علمت أن المبلغ الإجمالي المدفوع هو 285 دج، احسب عدد الركاب من كل صنف.

$$1; 3; 12$$